

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十五上

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣胡澄

欽定四庫全書

本草綱目卷三十五目錄

木之二

喬木類五十二種

內附四種

藥木

本經即黃藥

檀桓

拾遺

小藥

唐本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經浮爛羅勒附

杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

罌子桐

拾遺
郢桐附

海桐

開寶
難桐附

棟
本經

槐
本經

檀
拾遺

莢蓬
唐本

秦皮
本經

合歡
本經

皂莢
本經
鬼
皂角附

肥皂莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本
即沒食子

訶黎勒

唐本
即訶子

婆羅得

開寶

櫟

別錄

柳

本經

檉柳 開寶

水楊 唐本

白楊 唐本

扶移 拾遺

松楊 拾遺

榆 本經

榔榆 拾遺

蕪荑 本經

蘇方水

唐本

烏水

綱目

樺水

開寶

絞水

拾遺

櫚水

拾遺
即花櫚

椶櫚

嘉祐

檳水

拾遺

柯樹

拾遺

烏桕木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆

海藥

相思子

綱目

豬腰子

綱目

石爪

綱目

右附方舊一百三十五新三百二十二

本草綱目卷三十五目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷三十五上

明李時珍撰

水之二

喬木類十八種
內附三種

藥水

本經上品

釋名黃藥

別錄

根名檀桓

時珍曰

藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮豈古

時水與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰藥水生漢中山谷及永昌弘景曰今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其

根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀木圖經云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷中皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用之郃陵者治表治上用之各適其宜爾頌曰處處有之以蜀中出者肉厚色深為佳

修治

數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日漉出晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每五兩

用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦不制治下焦也時珍曰黃藥性寒而沈生用則降實火熟用

則不傷胃酒制則治上鹽
制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒

元素曰性寒味苦氣味俱厚沈而降陰也又云苦厚微辛陰中之陽入足

少陰經為足太陽引經藥好古曰黃芩梔子入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥也之才曰惡乾漆伏硫黃主治五臟腸胃中結

熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡

本經療

驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

別錄熱瘡皰起蟲瘡血痢止消渴殺蛀蟲

藏器

男子陰痿

及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄權

安心除勞治骨

蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蛇心痛鼻衄

腸風下血後急熱腫痛

大明

瀉膀胱相火補腎水不足

堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下竅除熱

元素

瀉

伏火救腎水治衝脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛

不可忍

李杲

得知母滋陰降火得蒼朮除濕清熱為治

痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

震亨

傳小兒頭

瘡

時珍

發明

元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血四也

臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿厥腰無力於黃芪湯中加用使兩足膝中氣方涌出痿軟即便去也乃癰瘕必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮灸論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥灸根黃含之也果曰黃蘗蒼朮乃治痿要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍

矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經
所謂開則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在
下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大
苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾入桂一錢為
引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀
刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出牀下成流顧盼之
間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤
之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒
瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱用也震亨曰黃
蘗走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也
火有二君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅
可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷
之火也陰火也不可以水濕折之常從其性而伏之
惟黃蘗之屬可以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗
滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母猶水母之

無蝦也蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷胃不能生陰之戒

附方

舊十二新

陰火為病

炒大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒褐為末水丸梧子大血

虛四物湯下氣虛四

男女諸虛

孫氏集效方坎離丸治男子婦人諸虛百

損小便淋瀝遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯
米一升童子小便浸之九浸九晒蒸過晒研為末酒
煮麪糊丸梧子大每上盛下虛水
服一百丸溫酒送下黃蘗一斤分作四分
用醇酒蜜湯鹽水童尿浸洗晒炒為末以如母一斤
去毛切搗熬膏和丸梧子大每服七十丸白湯下

活人心統

四治坎離諸丸

方見草部
蒼朮下

臟毒痔漏

下血不止
孫探玄集

效方藥皮丸用川黃蘗皮刮淨一斤分作四分三分
用酒醋童尿各浸七日洗晒焙一分生炒黑色為末
煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九丸久服除根
楊誠經驗方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮刮
淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾
切研廩米飯丸如上法服又陸一峯藥皮丸黃蘗
一斤分作四分分用醇酒鹽湯童尿各浸二日焙
研一分用酥炙研末以猪臟一除去膜入藥在內紮

煮熟搗丸如下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗灸上法服之為末水丸綠豆大每服七丸

溫水下名金虎小兒下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥丸普濟方四錢為末飯丸麻子大每

服一二十丸食前米飲妊娠下痢白色晝夜三五十下閻孝忠集效方行根黃厚者蜜炒

令焦為末大蒜煨熟去皮搗爛和丸梧子大每空心米飲下三五十九日三服神妙不可述婦人良方

小兒熱瀉黃蘗削皮焙為末用米湯和丸粟米大每服一二十丸米湯下十全博救方赤

白濁淫及夢洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而

降火蛤粉鹹而補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下

潔古積熱夢遺心忪恍惚膈中有熱宜清心丸主之家珍黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子

大每服十五丸
麥門冬湯下此大
消渴尿多
能食黃

智禪師方也
許學士本事方
水一升煮三五沸
渴即飲之恣嘔
血熱極
黃蘗蜜塗

飲數日即止
韋宙獨行方
麥門冬湯調服二
時行赤目
黃蘗去粗皮為末
濕紙

錢即瘥
經驗方
一彈子大紗帕色之
浸水一盞飯上蒸
熟垂熱熏洗
極效此方有金木
水火土故名五行
湯一丸可用三

二次
龍水論
嬰兒赤目
在薦內者人乳浸
黃眼目昏暗
每旦

含黃蘗一片吐津
流之終身卒喉痺
痛
黃蘗片含之
行之永無目疾矣
普濟方
又以一斤酒

一斗煮二沸恣飲
小兒重舌
黃蘗浸苦竹瀝
口舌生
便愈矣
肘后方
點之
千金方

瘡
外臺用黃蘗含之
良
深師用蜜清取汁
含之吐涎
冠氏衍義治心脾
有熱舌頰生瘡
蜜灸黃蘗

青黛各一分為末入生龍腦一字摻之吐涎 赴筵散用黃藥細辛等分為末摻或用黃藥乾薑等分亦

良

口疳臭爛

綠雲散用黃藥五錢銅綠二錢為末摻之漱去涎 三因方 鼻疳有

蟲

黃藥二兩冷水浸一宿絞汁溫服 聖惠方

鼻中生瘡

黃藥檳榔末猪脂和傅 普濟

方 屑瘡痛痒

黃藥末以薔薇根汁調塗立效 聖濟錄 鬢毛毒瘡 生頭中

蒲桃痛甚黃藥一兩乳香二錢半為末 小兒顫腫 生下

槐花煎水調作餅貼于瘡口 普濟方 即腫者黃藥末水調 傷寒遺毒 手足腫痛欲斷黃藥貼足心效 普濟方 五斤水三升煮漬之

肘方 癰疽乳發

初起者黃藥末和雞子白塗之乾即易之 梅師方 癰疽腫毒

黃藥皮炒川烏頭炮等分為末唾調塗 小兒臍瘡 合之留頭頻以米泔水潤濕之 集簡方

者黃蘗末塗之效子母秘錄小兒膿瘡遍身不乾用黃蘗末入枯

簡便方 男子陰瘡有二種一者陰蝕作白膿出一者只

洗之仍以黃蘗黃連作末傅之又法臙瘡熱瘡黃

黃蘗煎湯洗之塗以白蜜效肘后方火毒生瘡凡人冬月向

末一兩輕粉三錢猪膽汁調搽之或止用蜜灸黃蘗一味凍瘡裂

兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末婦病此人無識者有用此而愈張果醫說

痛之乳汁調黃蘗末塗自死肉毒自死六畜有毒以黃

肘后方 斂瘡生肌黃蘗末麴糊調宣明方

檀桓遺拾

集解

藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出靈寶

方時珍曰本經但言黃藥根名檀桓陳氏所說乃藥旁所生檀桓芝也與陶弘景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病安魂魄不饑渴久服

輕身延年通神

經本

長生神仙去萬病為散飲服方寸

匕盡一枚有驗

藏器

小藥

唐本草

釋名子藥

弘景

山石榴

時珍曰此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也

集解

弘景曰子藥樹小狀如石榴其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並主口瘡恭曰小藥生山石間

所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝
葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞
子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小
樹多刺而葉細者名刺藥非小藥也藏器曰凡是藥
木皆皮黃今既不黃非藥也小藥如石榴皮黃子赤
如枸杞子兩頭尖人到枝以染黃若云子黑而圓恐
是別物非小藥也時珍曰小藥山間時有之
小樹也其皮外白裏黃狀如藥皮而薄小

氣味苦大寒無毒主治口瘡疳蠱殺諸蟲去心腹中

熱氣治血崩

時珍婦人良方治血崩阿膠陀丸方中用之

黃櫨

宋嘉祐

集解藏器曰黃櫨生商洛山谷四川
界甚有之葉圓木黃可染黃色

水氣味苦寒無毒主治除煩熱解酒疸目黃水煮服

之藏器洗赤眼及湯火漆瘡時珍

附方新大風癩疾

黃櫨木五兩剉用新汲水一斗浸二七日焙研蘇枋木五兩烏麻子

一斗九蒸九暴天麻二兩丁香乳香一兩為末以赤黍米一升淘淨用浸黃櫨木煮米粥搗和丸梧子大每服二三十九食後漿水下日二夜一聖濟總錄

厚朴

本經中品

校正

併入有名未用逐折

釋名烈朴

日華

赤朴

別錄

厚皮

同

重皮

廣雅

樹名榛

別錄

子名

逐折

別錄紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

時珍曰其水質朴而皮厚味辛烈而色

紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮

方書或作
厚皮也

集解

別錄曰厚朴生交趾宛句三月九月十月采皮陰乾弘景曰今出建平宜都極厚肉紫色為好

殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也頌曰今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春生葉如櫟葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪宗奭曰今伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫色有油時珍曰朴樹膚白肉紫葉如櫟葉五六月間細花細實如冬青子生青熟赤有核七八月采之味甘美

皮修治

數曰凡使要紫色味辛者為好刮去粗皮入丸散每一斤用酥四兩炙熟用若入湯飲用自然

薑汁八兩炙盡為度大明曰凡入藥去粗皮用薑汁炙或浸炒用宗奭曰味苦不以薑制則棘人喉舌

氣味苦溫無毒

別錄曰大溫吳普曰神農岐伯雷公苦無毒李當之小溫權曰苦辛大熱

元素曰氣溫味苦辛氣味俱厚體重濁而微降陰中陽也杲曰可升可降之才曰乾薑為之使惡澤瀉硝

石寒水石忌
豆食之動氣

主治中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺

死肌去三蟲

經本

溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛

脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱

心煩滿厚腸胃

別錄

健脾治反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉

膀胱及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸

中蟲明耳目調關節

明大治積年冷氣腹內雷鳴虛吼

宿食不消去結水破宿血化水穀止吐酸水大溫胃

氣治冷痛主病人虛而尿白甄權主肺氣脹滿膨而喘

效好古

發明

宗奭曰厚朴平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為世所須也元素

曰厚朴之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之三也雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤服脫人元氣惟寒脹大熱藥中兼用乃結者散之之神藥也震亨曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉胃中之實也平胃散用之佐以蒼朮正為瀉胃中之濕平胃土之太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補衰哉其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤服參芪藥多補氣脹悶或作

喘宜此瀉之好古曰本草言厚朴治中風傷寒頭痛
溫中益氣消痰下風厚腸胃去腹滿果泄氣乎果益
氣乎蓋與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下
氣是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿所謂溫中
益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥
同用則厚腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則
補也故成無己云厚朴之苦以泄腹滿果曰
若能下氣故泄實滿溫能益氣故散濕滿

附方

舊七
新七

厚朴煎丸

孫兆甫云補腎不如補脾胃
氣壯則能飲食飲食既進則益

營衛養精血滋骨髓是以素問曰精不足者補之以
味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛損溫中降
氣化痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等證用厚朴去皮剉
片用生薑二斤連皮切片以水五升同煮乾去薑焙
朴以乾薑四兩甘草二兩再同厚朴以水五升煮乾
去草焙薑朴為末用棗肉生薑同煮熟去薑搗棗和

丸梧子大每服五十丸米飲下一
方加熟附子王瑒百一選方
痰壅嘔逆心胸滿

飲食厚朴一兩薑汁炙黃為末非
時米飲調下二錢匕效
腹脹脈數厚朴三

厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五升入大
黃四兩再煎三升溫服一升轉動更服不動勿服

張仲景金匱要畧
腹痛脹滿厚朴七物湯用厚朴半斤制甘
草大黃各三兩棗十枚大枳實

五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升溫
服八合日三嘔者加半夏五合
男女

氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈厚朴薑汁
炙焦黑為末以陳米飲調服二錢匕日三服

斗門反胃止瀉上方同
中滿洞瀉厚朴乾薑等分為末
蜜丸梧子大每服五

十九米飲下小兒吐瀉胃虛及有痰驚梓朴散用梓
鮑氏方州厚朴一兩半夏湯泡七次

薑汁浸半日晒乾一錢以米泔三升同浸一百刻水盡為度如未盡少加火熬乾去厚朴只研半夏每服

半錢或一字薄荷湯調霍亂腹痛厚朴湯用厚朴炙下錢乙小兒直訣四兩桂心二兩枳

實五枚生薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方也唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治霍

亂凡諸病皆治聖惠方用厚朴下痢水穀久不瘥薑汁炙研末新汲水服二錢如神者厚朴

三兩黃連三兩水三升煎大腸乾結厚朴生研猪臟一升空心細服梅師方厚朴和九梧子

大每薑水下三十尿渾白濁厚朴薑汁炙一兩白茯苓十便良方厚朴薑汁炙一兩白茯苓

苓一錢水酒各一椀煎月水不通厚朴三兩炙切水一椀溫服經驗良方三升煎一升分二

服空心飲不過三四劑神驗一加桃仁紅花出梅師方

逐折氣味甘溫無毒主治療鼠瘻明目益氣

別錄

正誤

別錄有名未用曰逐折殺鼠益氣明目一名百合一名厚實生木間莖黃七月實黑如大豆引

景曰杜仲子亦名逐折別錄厚朴條下已言子名逐折而有名未用中復出逐折主治相同惟鼠瘻殺

鼠字誤未知孰是爾所云厚實乃厚朴實也故皮謂之厚皮陶氏不知援引杜仲為註皆誤矣今正之

附錄浮爛羅勒

藏器曰生康國皮似厚朴味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺調

腑臟

杜仲

本經上品

釋名思仲

別錄

思仙

本經

水綿

吳普

綿

時珍

曰昔有杜仲服

此得道因以名之思

仲思仙皆由此義其皮中有銀絲如綿故曰木綿其子名逐折與厚朴子同名

集解

別錄曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中二月五

虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲者為佳保昇曰生深山山谷所在有之樹高數丈葉似辛夷頌曰今出商州成州峽州近處大山中葉亦類拓其皮折之白絲相連江南謂之櫟初生嫩葉可食謂之櫟芽花實苦澀亦堪入藥水可作履益脚

皮修治

敷曰凡使削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗炙以盡為度細剉用

氣味辛平無毒

別錄曰甘溫權曰苦煖元素曰性溫味辛甘氣味俱薄沈而降陰也杲曰

陽也降也好古曰肝經氣分藥也之才曰惡玄參蛇蛻皮

主治腰膝痛補中益

精氣堅筋骨強志除陰下瘰濕小便餘瀝久服輕身

耐老

本經

脚中酸疼不欲踐地

別錄

治腎勞腰脊攣

大明腎

冷腎腰痛人虛而身強直風也腰不利加而用之

甄權

能使筋骨相著

李杲

潤肝燥補肝經風虛

好古

發明

時珍

曰杜仲古方只知滋腎

惟王好古言是肝

經氣分藥潤肝燥補肝虛發昔人所未發也蓋

肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈申利用

皆屬於筋杜仲色紫而潤味甘微辛其氣溫平甘溫

能補微辛能潤故能入肝而補腎子能令母實也按

龐元英談藪一少年新娶後得脚軟病且疼甚醫作

脚氣治不效路鈴孫琳診之用杜仲一味寸斷片拆

每以一兩用半酒半水一大盞煎服三日能行又三

日全愈琳曰此乃腎虛非腳氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為效容易矣

附方

舊三新三

青娥丸

方見補骨脂下

腎虛腰痛

崔元亮海上集驗方用杜仲去

皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再

煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服聖惠方入薤白七莖

風冷

傷腎

腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日服三合此陶隱居得效方也

以溫酒服二錢病後虛汗

及目中流汁杜仲牡蠣等分為末卧時水服五匕不止更服之

後頻慣墮胎

或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒

浸焙乾為末以山藥五六兩為末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下肘後方用杜仲焙研棗肉為

九糯米飲下
產後諸疾
及胎臟不安杜仲去皮瓦焙乾水曰搗末煮棗肉

和丸彈子大每服一丸糯米飲下日二服
勝金方

綿芽氣味缺
主治作蔬去風毒脚氣久積風冷腸痔

下血亦可煎湯

蘇頌

椿

唐本草

校正

併入嘉祐椿莢

釋名香者名椿

集韻作樛夏書作杞左傳作檜

臭者名樛

音丑居切亦作樛

山樛名考

音考

虎目樹

拾遺

大眼桐

時珍曰椿樛易長而多壽考故有椿樛之

稱莊子言大椿以八千歲為春秋是矣椿香而樛臭故椿字又作樛其氣熏也樛字從樛其氣臭人呵噀

之也。樗亦椿音之轉。爾藏器曰：俗呼椿為猪椿。北人呼樗為山椿。江東呼為虎目樹，亦名虎眼。謂葉脫處有痕如虎之眼目。又如樗蒲子，故得此名。

集解

恭曰：椿樗二樹形相似，但樗木疏，椿木實為別也。頌曰：二木南北皆有之，形幹大抵相類，但椿

木實而葉香，可噉。樗木最為無用。莊子所謂吾有大木，人謂之樗，其本擁腫不中繩墨，小枝曲拳不中規矩者，爾雅云：樗，山樗。郭璞註云：樗似樗，色小白，生山中，因名。亦類漆樹。俗語云：樗樗漆相似。如一陸璣詩疏云：山樗與田樗無異，葉差狹，爾吳人以葉為茗。宗奭曰：椿樗皆臭，但一種有花，結子一種無花，不實。世以無花而木身大，其幹端直者為椿。椿木用葉，其有花莢而木身小，幹多迂矮者為樗。樗用根及莢，葉又虫部有樗，難不言椿。難以顯有難者為樗，無難者為椿。古

人命名其義甚明禹錫曰樗之有花者無莢有莢者無花其莢夏月常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故呼樗莢為椿莢爾時珍曰椿樗考乃一木三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹樗木皮粗肌虛而白其葉臭惡數年人或采食樗木即樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然爪之如腐朽故古人以為不材之水不似椿木堅實可入棟梁也

葉氣味苦溫有小毒

說曰椿芽多食動風熏十二經脈五臟六腑令人神昏血氣微

若和猪肉熟麪頻食則中滿蓋擁經絡也時珍曰椿葉無毒樗葉有小毒

主治煮水洗瘡

疥風疽樗木根葉尤良

唐本

白禿不生髮取椿桃楸葉

心搗汁頻塗之

時珍

嫩芽瀹食消風祛毒

生生編

白皮及

根皮修治

數曰凡使椿根不近西頭者為上采出拌生葱蒸半日到細以袋盛掛屋南畔陰乾

用時珍曰椿樗木皮根皮並刮去粗皮陰乾臨時切焙入用

氣味苦溫無毒

權曰微熱震亨曰涼而燥藏器曰樗根有小毒時珍曰樗根制硫黃砒石

金黃主治疳蠱樗根尤良

唐本

去口鼻疳蟲殺虺蟲疥蠱

鬼注傳尸蠱毒下血及赤白久痢

藏器

得地榆止疳痢

蕭炳止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉血不住腸

滑瀉縮小便蜜炙用

明大

利溺澀

雷數

治赤白濁赤白帶

濕氣下痢精滑夢遺燥下濕去肺胃陳積之痰

震亨

發明

帶下宜取東引細椿根一大握洗淨以水一大

升煮汁分服便斷小兒疳痢亦宜多服仍取白皮一握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉兩合水一升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能溫血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下濕及去肺胃陳痰之功治泄瀉有除濕實腸之力但痢疾滯氣未盡者不可遽用宜入丸散亦可煎服不見有害予每用炒研糊丸看病作湯使名固腸丸也時珍曰椿皮色赤而香檗皮色白而臭多服微利人蓋椿皮入血分而性瀉檗皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而瀉利之效則異正如伏苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受病有鬱者宜用檗皮此心得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用檗皮以無根水研汁服二三碗取利數行是其驗矣故陳藏器言檗

皮有小毒蓋有所試也宗爽曰洛陽一女年四十
六七耽飲無度多食魚蟹畜毒在臟日夜二三十瀉
大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血
痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無膿
如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛
血愈下服冷藥即注泄食減服溫平藥則病不知如
此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減
三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸風虛飲
酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用檓根白皮
一兩人參一兩為末每服二錢空心溫酒調服米飲
亦可忌油膩濕麪青菜果
子甜物雞豬魚羊蒜薤等

附方

舊十六
新十

去鬼氣

檓根一握

細切

以童兒小便

二升

一沸三五

升

日一度服之
陳藏器本草

小兒疳疾

檓根一握細切以童兒小便二升一沸三五
升
栗米淘淨研濃汁和丸梧

子大十歲三四九米飲下量人加減仍以一小兒疳

疳

困重者用檇白皮搗粉以水和棗作大餅飽子日

者不過七服忌油膩熱麪毒物又方用檇根濃汁

一蠅殼和粟米泔等分灌下部再度即瘥其驗如神

大人亦宜用休息痢疾撮痛東垣脾胃論用椿根白

皮訶黎勒各半兩母丁香三十箇為末醋糊丸梧子

大每服五十九米飲下唐瑤經驗方用椿根白皮

東南行者長流水內漂三日去黃皮焙為末每一兩

加水香二錢梗米飯為丸每服一錢二分空腹米飲

下水穀下痢

及每至立秋前後即患痢兼腰痛取檇

子大水煮熟每日空心服十枚並下痢清血腹痛椿根

無禁忌神良

劉禹錫傳信方

下痢清血

腹痛椿根

白皮洗刮晒研醋糊丸梧子大每空心米飲臟毒下
下三四十丸一加蒼术枳殼減半經驗方

痢

赤白用香椿洗刮取皮日乾為臟毒下血用溫白丸
未飲下一錢立效也經驗方

白皮去粗皮酒浸晒研棗肉和丸梧子大每下血經
淡酒服五十丸或酒糊丸亦可儒門事親

年

樗根二錢水一盞煎七分入酒半盞服或作血痢
丸服虛者加人參等分即虎眼樹仁存方

下血

臘月日未出時取背陰地北引樗根皮東流水
洗淨掛風處乾為末每二兩入寒食麴一兩

新汲水送下忌見日則無效名如神丸出水煮滾傾出脾
溫水送下

毒腸風

因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸間
故大便秘下血用臭椿根刮去粗皮焙乾四兩

蒼术米泔浸焙枳殼麴炒各一兩為末醋糊丸如產
梧子大每服五十丸米飲下日三服效本事方

後腸脫

不能收拾者，撈枝取皮，焙乾，一握水五升，連根葱五莖，漢椒一撮，同煎至三升，去滓，傾盆

內，乘熱熏洗，冷則再熱，一服可作五次，用洗後睡少時，忌鹽、鮓、醬、麪，發風毒物，及用心勞力等事，年深者

亦治之

婦人良方 女人白帶

椿根、白皮、滑石等分，為末，粥丸。梧子、大腹、白湯下一百丸。

黃蘗

又方：椿根、白皮一兩半，乾薑炒黑，白芍藥炒黑，男藥炒黑，各二錢，為末，如上法丸服。丹溪方。

子白濁

上方同

莢釋名鳳眼草

形象

主治大便下血

嘉祐

附方

新

腸風瀉血

椿莢半生，半燒，為末，每服三錢，半飲下。

出普濟方

誤吞魚

刺

生生編：用椿樹子，陰乾，半盞擂碎，熱酒衝服。良久連骨吐。

出洗頭明目

用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子加椿皮灰尤

佳正月七日二月八日三月四日四月五日五月二
日六月四日七月七日八月三日九月二十日十月
二十三日十一月二十九日十二
月十四日洗之
衛生易簡方

漆

本經上品

釋名漆

時珍曰許慎說文云漆本作泰木汁可以繫物其字象水滴而下之形也

集解

別錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州漆性急易燥其諸

處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇
曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花似槐其子似牛
李子木心黃六月七月刻取滋汁金州者最善漆性
並急凡取時須荏油解破故淳者難得可重重別制

拭之上等清漆色黑如璧若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳頌曰今蜀漢今峽襄歙州皆有之以竹筒釘入水中取汁崔豹古今注云以剛斧斫其皮開以竹管承之滴汁則成漆也宗奭曰濕漆藥中未見用者皆乾漆爾其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗於乾竹上蔭之連乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如椿以金州者為佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈎撼成琥珀色打著有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小榎而大六月取汁漆物黃澤如金即唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

乾漆修治

大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好亦有燒存性者

氣味辛溫無毒

權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平有毒降也陽中陰也

之才曰半夏為

之使畏難子忌油脂弘景曰生漆毒烈人以難子和服之去蟲猶自齧腸胃也畏漆人乃致死者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰毒發飲鐵漿并黃蘗汁甘豆湯喫蟹並可制之時珍曰今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蟹而咸水蓋物性相制也凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草湯蟹湯浴之皆良

主治絕傷補中續

筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺生漆去長

蟲久服輕身耐老

經本

乾漆療欬嗽消瘀血痞結腰痛

女子疝瘕利小腸去虺蟲

別錄

殺三蟲主女人經脈不

通甄權治傳尸勞除風明大削年深堅結之積滯破日久

凝結之瘀血元素

發明

弘景曰仙方用蟹消漆為水鍊服長生抱朴子云淳漆不粘者服之通神長生或以大蟹投其

中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出服至一年六甲行厨至也震亨曰漆屬金有水與火性急而飛補用為去積滯之藥中節則積滯去後補性內行人不知也時珍曰漆性毒而殺蟲降而去其功只在二者而已

附方

舊四新七小兒蟲病胃寒危惡證與痢相似者乾漆搗燒烟盡白蕪荑等分為末米

飲服一字至一錢止杜仁方九腫心痛及腹脇積聚滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟盡研末醋

煮麪糊凡梧子大每服五丸
至九丸熱酒下簡要濟衆
女人血氣長血氣疼痛
不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者並宜服二聖
丸濕漆一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧子大
每服三四丸溫酒下怕
漆人不可服經驗方
女人經閉指南方萬應丸治
來繞臍寒症痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等病用
乾漆一兩打碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一
升入銀石器中慢熬俟可丸如梧子大每服一丸
加至三五丸酒飲任下以通為度產寶方治女人
月經不利血氣上攻欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆
三錢炒烟盡為末煉蜜丸梧子大每服十五丸空心
溫酒下千金治女人月水不通臍下堅如盂時發
熱往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可治也乾
漆一斤燒研生地黃二十斤取汁和煎產後青腫疼
至可丸九梧子大每服三九空心酒下

及血氣水疾乾漆大麥芽等分為末新瓦甑相間鋪
滿鹽泥固濟煨赤放冷研散每服一二錢熱酒下但

是產後諸疾皆可五勞七傷補益方用乾漆柏子仁
服婦人經驗方山茱萸酸棗仁各等分

為末蜜丸梧子大每服二七喉痺欲絕不可針藥者
九溫酒下日二服千金方乾漆燒烟以

筒吸之聖濟總錄解中蠱毒平胃散末以生漆和丸梧子大
每空心溫酒下七十九至百丸

指方直下部生瘡生漆塗之良
見肘後方

漆葉氣味缺主治五尸勞疾殺蟲暴乾研末日用酒

服一錢七時珍

發明頌曰華佗傳載彭城樊阿少師事佗佗授以漆
葉青黏散方云服之去三蟲利五臟輕身益氣

使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之
青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理
五臟益精氣本出於迷入山見仙人服之以告佗
佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強
盛問之因醉誤說人服多驗後無復人識青黏或云
即黃精之正葉者也時珍曰按葛洪抱朴子云漆葉
青黏凡數之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰
明猶能持鍼治病此近代之實事良史所記者按洪
說猶近於理前言可年五百
歲者誤也或云青黏即歲蕤

漆子主治下血

時珍

漆花主治小兒解顱腹脹交脛不行方中用之

時珍

梓

本經
下品

釋名木王

時珍曰梓或作杼其義未詳按陸佃埤雅云梓為百木長故呼梓為木王蓋木莫良

于梓故書以梓材名篇禮以梓人名匠朝廷以梓宮名棺也羅願云屋室有此木則餘木皆不震其為木

知可

集解

別錄曰梓白皮生河內山谷弘景曰此即梓樹之皮梓有三種當用朴素不腐者頌曰今近道

皆有之宮寺人家園亭亦多植之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩廊風云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸璣注云楸之疎理白色而生子者為梓梓實桐皮為椅大同而小異也入藥當用有子者又一種鼠梓一名棟亦楸屬也枝葉水理皆如楸今人謂之苦楸江東人謂之虎梓詩小雅云北山有棟是也鼠李一名鼠梓或云即此然花實都不相類恐別一物而名同爾藏器曰楸生山谷間與梓樹本同

末異或以為一物者誤矣大明曰梓有數般惟楸梓皮入藥佳餘皆不堪機曰按爾雅翼云說文言椅梓也梓楸也櫟亦楸也然則椅梓櫟楸一物四名而陸璣詩疏以楸之白理生子者為梓梓實桐皮者為椅賈思勰齊民要術又以白色有角者為梓即角楸也又名子楸黃色無子者為椅楸又名荆黃楸但以子之有無為別其角細長如箸其長近尺冬後葉落而角猶在樹其實亦名豫章時珍曰梓水處處有之有三種水理白者為梓赤者為楸梓之美文者為椅楸之小者為櫟諸家疏注殊欠分明桐亦名椅與此不同此椅即尸子所謂荆有長松文椅者也

梓白皮氣味苦寒無毒主治熱毒去三蟲

本經

療目中

疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之

并搗傳

別錄

煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚癢癢

大明

治溫病復感寒邪變為胃呃煮汁飲之

時珍

附方

新

一時氣溫病

頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升

五合

煎汁每服八

合取瘥肘后方

葉主治搗傳猪瘡飼猪肥大三倍

別錄

療手脚火爛瘡

弘景曰桐葉梓葉肥猪之法未見應在商丘子養猪經中恭曰二樹花葉飼猪並能肥大且易養見李當之本草及博物志然不云傳猪瘡也

附方

新

風癰疣瘡

梓葉木綿子羯羊屎鼠屎等分入瓶中合定燒取其汁塗之試效

錄驗方

楸拾遺

釋名楸

時珍曰楸葉大而早脫故謂之楸楸葉小而早秀故謂之楸唐時立秋日京師賣楸葉婦

女兒童剪花戴之取秋意也爾雅云葉小而散楸葉大而散楸音鵲皮粗也

集解

見梓下

周憲王曰楸有二種一種刺楸其樹高大皮色蒼白上有黃白斑點枝梗間多大刺

葉似楸而薄味甘嫩時煤熟水淘過拌食時珍曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之楸線其木濕時脆燥則堅故謂之良材宜作棋枰即梓之赤者也

木白皮氣味苦小寒無毒

珣曰微溫

主治吐逆殺三蟲及

皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽癰腫疔痔除膿血生肌

膚長筋骨

藏器

消食澀腸下氣治上氣欬嗽亦入面藥

李珣口吻生瘡貼之頻易取效

時珍

附方

舊一

瘰癧瘡

楸枝作煎頻洗取效

肘后方

白癰風瘡

楸白皮五斤水五斗

煎五升去滓煎如稠膏
日三摩之
聖濟總錄

葉氣味

同皮

主治擣傅瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉用

之諸癰腫潰及內有刺不出者取葉十重貼之

藏器出

范汪

方

發明

時珍曰楸乃外科要藥而近人少知葛常之韻語陽秋云有人患發背潰壞腸胃可窺百方不

瘥一醫用立秋日太陽未升時采楸樹葉熬之為膏傳其外內以雲母膏作小丸服盡四兩不累日而愈

也東晉范汪名醫也亦稱楸葉治瘡腫之功則楸有拔毒排膿之力可知

附方

舊一
新七

上氣欬嗽

腹滿羸瘦者楸葉三斗水三斗煮三十沸去滓煎至可丸如棗

大以筒納入下部中立愈

崔元亮

海上集驗方

一切毒腫

不問硬軟取楸葉十重傳腫上

舊帛裹之日三易之當重重有毒氣為水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傳之皆效止

痛消腫食膿血勝于衆藥

范汪東陽方療癰瘻瘡

楸煎神方秋分前後早晚令人持袋摘楸

葉納袋斤秤取十五斤以水一石淨釜中煎取三斗又換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器

中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化
又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中
攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子勻塗
煎滿瘡上仍以軟帛裹之且日一拭更上新藥不過
五六上已破者即便生肌未破者即內消瘰癧後須將
慎半年采藥及煎時并禁孝子婦人僧道雞犬見之

篦

灸瘡不瘥

瘡痛不瘥

瘡葉

頭及根

聖惠方

頭瘡生瘡

瘡

瘡

瘡

搗汁頻塗
聖惠方
兒髮不生

頻塗

葉

中心

搗汁

小兒

目翳

嫩

葉

三

兩爛搗紙包泥裹燒乾去泥入水少許絞汁銅
器慢熬如稀錫瓷合收之每旦點之
普濟方
小兒

禿瘡

葉

搗汁塗

之

聖惠方

桐

本經
下品

釋名白桐

弘景圖經泡桐目

椅桐

弘景時珍曰本

白桐也桐華成筒故謂之桐其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白桐泡桐古謂之椅桐也先花後葉故

爾雅謂之榮桐或言其花而不實者未之察也陸璣以椅為梧桐郭璞以榮為梧桐並誤

集解

別錄曰桐葉生桐柏山谷弘景曰桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐皮白葉似青桐

而有子子肥可食白桐一名椅桐人家多植之與崗桐無異但有花子二月開花黃紫色禮云三月桐始華者也堪作琴瑟崗桐無子是作琴瑟者本草用桐華應是白桐頌曰桐處處有之陸璣草木疏言白桐宜為琴瑟雲南牂牁人取花中白毳淹漬績以為布似毛服謂之華布椅即梧桐也今江南人作油者即岡桐也有子大于梧子江南有賴桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煮以噉嶺南有刺桐花色

深紅宗爽曰本經桐葉不指定是何桐致難執用但四種各有治療白桐葉三枚開白花不結子無花者為岡桐不中作琴體重荏桐子可作桐油梧桐結子可食時珍曰陶注桐有四種以無子者為青桐岡桐有子者為梧桐白桐冠注言白桐岡桐皆無子蘇注以岡桐為油桐而賈思勰齊民要術言實而皮青者為梧桐華而不實者為白桐白桐冬結似子者乃是明年之華房非子也岡桐即油桐也子大有油其說與陶氏相反以今咨訪互有是否蓋白桐即泡桐也葉大徑尺最易生長皮色粗白其水輕虛不生蟲蛀作器物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢葵實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐荏桐即油桐也青桐即梧桐之無實者按陳蕭桐譜分別白桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體性慢喜生朝陽之地因子而出者一年可起三四尺由根而出者可

五七尺其葉圓大而尖長有角光滑而毳先花後葉
花白色花心微紅其實大二三寸內為兩房房內有
肉肉上有薄片即其子也紫花桐文理細而體性堅
亦生朝陽之地不如白桐易長其葉三角而圓大如
白桐色青多毛而不光且硬微赤亦先花後葉花色
紫其實亦同白桐而微尖狀如訶子而粘房中肉黃
色二桐皮色皆一但花葉小異體
性堅慢不同爾亦有冬月復花者

桐葉氣味苦寒無毒主治惡蝕瘡著陰

本經

消腫毒生

髮

時珍

附方

新

手足腫浮

桐葉煮汁漬之并飲少許

癰疽發

背

大如盤臭腐不可近桐葉醋蒸貼上退熱止

髮落

不生

桐葉一把麻子仁三升米泔煮五六沸去滓日日洗之則長

肘後方

髮白染黑

經霜桐葉及子多收搗碎以甌蒸之生布絞汁沐頭

普濟方

水皮主治五痔殺三蟲

本經

療奔豚氣病

別錄

五淋沐髮

去頭風生髮滋潤

甄權

治惡瘡小兒丹毒煎汁塗之

時珍

附方

新

腫從脚起

削桐木煮汁漬之并

傷寒發狂

七

日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑擘斷四寸一束以酒五合水一升煮半升去滓頓服當吐下青黃

汁數升即瘥

跌撲傷損

木桐樹皮去青留白醋炒搗傅

集簡方

花主治傳猪瘡飼猪肥大三倍

本經

附方 新眼見諸物 禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子花酸棗仁玄明粉羌活各一兩為末

每服二錢水煎和滓
日三服 經驗良方

梧桐

綱目

釋名 櫨

時珍曰梧桐名義未詳爾雅謂之櫨因其可為棺左傳所謂桐棺三寸是矣舊附桐下今

別出
條

集解

弘景曰梧桐皮白葉似青桐而子肥可食頌曰陶氏謂白桐一名椅桐陸璣謂梓實桐皮為椅

即今梧桐是二種俱有椅名也遁甲書云梧桐可知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上月十二月有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異宗爽曰梧桐四月開

嫩黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油沾漬衣履
五六月結子人收炒食味如菱芡此是月令清明桐
始華者時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不皴
其木無節直生理細而性緊葉似桐而稍小光滑有
尖其花細蓋墜下如醖其莢長三寸許五片合成老
則裂開如箕謂之橐鄂其子綴於橐鄂上多者五六
少或二三子大如胡椒其皮皺羅願爾雅翼云梧桐
多陰青皮白骨似青桐而多子其木易生烏銜子墮
輒生但晚春生葉早秋即凋古稱鳳凰非梧桐不棲
豈亦食其實乎詩云梧桐生矣于彼朝陽齊民要術
云梧桐生山石間者為樂器更鳴響也

木白皮氣味

缺

主治燒研和乳汁塗鬚髮變黃赤

時珍

治腸痔

蘇頌刪繁方治痔
青龍五生膏中用之

葉主治發背灸焦研末蜜調傅乾即易

肘后

子氣味甘平無毒主治擣汁塗拔去白髮根下必生

黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研摻

時珍

罌子桐

拾遺

釋名虎子桐

拾遺

荏桐

衍義

油桐

時珍

曰罌子

因實狀似

荏

也虎子以其毒也荏

似

者言其油似荏油也

集解

藏器曰

罌子桐生山中樹似梧桐

頌曰南人作

油者乃岡桐也

有子大于梧子

宗爽曰荏桐早

春先開淡紅花狀如鼓子

花成筒子可作桐油時

珍曰岡桐即白桐之紫花者

油桐枝幹花葉並類岡

珍曰岡桐即白桐之紫花者油桐枝幹花葉並類岡

桐而小樹長亦遲花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其肉白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多種時收子貨之為油入漆家及船船用為時所須人多偽之惟以篋圈煎起如鼓面者為真

桐子油氣味甘微辛寒有大毒

大明曰冷微毒時珍曰桐油吐人得酒即

解

主治摩疥癬蟲瘡毒腫毒鼠至死

藏器

傳惡瘡及宣

水腫塗鼠咬處能辟鼠

大明

塗脛瘡湯火傷瘡吐風痰

喉痺及一切諸疾以水和油掃入喉中探吐或以子

研末吹入喉中取吐又點燈燒銅箸頭烙風熱爛眼

亦妙
時珍

附方

新

癰腫初起

桐油點燈入竹筒內薰之得
出黃水即消去
醫林正宗

血風

臙瘡

胡粉煨過研桐油調作隔紙膏貼之
又方用
船上陳桐油石灰煨過又以人髮拌桐油炙乾

為末仍以桐油
上刺孔貼之

楊起簡便方

脚肚風瘡

如癩桐油人
乳等分掃之

數次即愈

酒皸赤鼻

桐油入黃丹雄黃
傳之摘玄方

凍瘡皸裂

桐油

一盞髮一握熬化瓶收每以溫
水洗令軟溥之即安

救急方

解砒石毒

桐油二升
灌之吐即

毒解
危病方

華

附錄
榔桐

音而郢切藏器曰生山谷間狀似青桐葉
有極人取皮以漚絲木皮味甘溫無毒治

蠶咬毒氣入腹末服之難犬食蠶欲死者煎汁
灌之絲爛即愈葉主蛇蟲蜘蛛咬毒搗爛封之

海桐

宋開寶

釋名刺桐

珣曰生南海山谷中樹似桐而皮黃白色有刺故以名之

集解

頌曰海桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩

入水不爛不拘時月采之又云嶺南有刺桐葉如梧
桐其花附幹而生側敷如掌形若金鳳枝幹有刺花
色深紅江南有賴桐紅花無實時珍曰海桐皮有巨
刺如龜甲之刺或云即刺桐皮也按嵇含南方草木
狀云九真有刺桐布葉繁密三月開花赤色照映三
五房凋則三五復發陳蕭桐譜云刺桐生山谷中文
理細緊而性喜折裂體有巨刺如櫟樹其實如楓顏
桐身青葉圓大而長高三四尺便有花成朵而繁紅

色如火為
夏秋榮觀

水皮氣味苦平無毒

大明曰溫

主治霍亂中惡赤白久痢

除疳蠱疥癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除

膚赤

開寶

主腰脚不遂血脉頑痺腿膝疼痛赤白瀉痢

李珣去風殺蟲煎湯洗赤目

時珍

發明

頌曰古方多用浸酒治風蹶南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云頌年予在姑熟得腰膝痛

不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因覽劉禹錫傳信方備有此驗修服一劑便減五分其方用海桐

皮二兩牛膝芍窮羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半錢薏苡仁二兩生地黃十兩並淨洗焙乾剉以綿

包裏入無灰酒二斗浸之冬二匕夏一匕空心飲一
盞每日早午晚各一次長令醺醺此方不得添減禁
毒食時珍曰海桐皮能行經絡
達病所又入血分及去風殺蟲

附方

新

風癬有蟲

海桐皮

蛇牀子

等分

為末

以臘

風

猪脂調搽之

艾元英如宜方

風

風

風

風

風

風

風

風

蟲牙痛

海桐皮

煎水漱

聖惠方

中惡

霍亂

海桐皮

煮汁服

聖濟總錄

中惡

霍亂

海桐皮

煮汁服

聖濟總錄

中惡

霍亂

海桐皮

煮汁服

聖濟總錄

中惡

霍亂

刺桐花

主治

止金瘡

血殊效

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

蘇頌

附錄雞桐

時珍曰

生嶺南山間

其葉如楝

用葉煮湯

洗滌足膝

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

風濕痺氣

楝

本經

下品

釋名苦楝

圖經

實名金鈴子

時珍曰

按羅願爾雅翼云

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

楝葉可以練物

故謂之楝

其子如小鈴熟則黃色名金鈴象形也

集解

別錄曰棟實生荆山山谷弘景曰處處有之俗人五月五日取葉佩之云辟惡也恭曰此有雌

雄兩種雄者無子根亦有毒服之使人吐不能止時有至死者雌者有子根白微毒入藥當用雌者頌曰

棟實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二

月采之根采無時時珍曰棟長甚速三五年即可作椽其子正如圓象以川中者為良王禎農書言鵲雛

食其實應劭風俗通言獬豸食其葉宗懷歲時記言蛟龍畏棟故端午以葉包粽投江中祭屈原

實修治

數曰凡采得熟乾酒拌令透蒸待皮軟刮去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不使肉

如使核搥碎用漿水煮一伏時曬乾其花落子謂氣之石茱萸不入藥用嘉謨曰石茱萸亦入外科用氣

味苦寒有小毒

元素曰酸苦平陰中之陽時珍曰得酒煮乃寒因熱用也茴香為之使

主治溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道

經本

主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使甄權入心

及小腸止上下部腹痛

李杲

瀉膀胱

古

治諸疰蟲痔

時珍

發明

元素曰熱厥暴痛非此不能除時珍曰棟實導小腸膀胱之熱因引心色相火下行故心腹痛

及疰氣為要藥甄權乃言不入湯使則本經何以有治熱狂利小便之文耶近方治疰有四治五治七治

諸法蓋亦配合之巧耳

附方

舊三

新八熱厥心痛

或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪崑崙引熱下行內服

金鈴散用金鈴子玄胡索各一兩為末小兒冷疝氣
每服三錢溫酒調下 潔古活法機要

膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢半為末
酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸 全幼心鑑文

夫疝氣本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇
溫湯浸過去皮巴豆二百箇微打破以麩二

升同於銅鐺內炒至金鈴子赤為度放冷取出核
為末巴麩不用每服三錢熱酒或醋湯調服一方入

鹽炒茴香半兩癰疽腫痛澹寮方棟實丸治鉤腎偏墜
兩經驗方

分作五分一兩用破故紙二錢炒黃一兩用小茴香
三錢食鹽半錢同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩

用牽牛子三錢同炒一兩用斑蝥七枚去頭足同炒
棟去食鹽萊菔牽牛斑蝥只留故紙茴香同研為末

以酒打麩糊丸梧子大每空心酒下五十丸得效
方棟實丸治一切疝氣腫痛大有神效用川棟子酒

潤取肉一斤分作四分四兩用小麥一合斑蝥四十
九箇同炒熟去螯四兩用小麥一合巴豆四十九枚
同炒熟去豆四兩用小麥一合巴戟肉一兩同炒熟
去戟四兩用小茴香一合食鹽一兩同炒熟去鹽加
破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩為末酒煮麴
糊丸梧子大每服五十丸鹽湯空心下日三服直
指方棟實丸治外腎脹大麻木痛破及奔豚疝氣用
川棟子四十九箇分七處切取肉七箇用小茴香五
錢同炒七箇用破故紙二錢半同炒七箇用黑牽牛
二錢半同炒七箇用食鹽二錢同炒七箇用蘿蔔子
二錢半同炒七箇用巴豆十四箇同炒七箇用斑蝥
十四箇去頭足同炒棟去蘿蔔子巴豆斑蝥三味不
用入青木香五錢南木香官桂各二錢半為末酒煮
麴糊丸梧子大每服三十九食前用鹽湯下一日三
服
臟毒下血 苦棟子炒黃為末蜜丸梧子大
腹中 飲每吞十九至二十九 經驗方

長蟲

棟實以淳苦酒漬一宿綿裹塞入穀耳卒熱腫道中三寸許日二易之外臺秘要

棟實五合搗爛綿裹腎消膏淋病在下焦苦棟子苗塞之頻換聖惠方香等分炒為末每溫

酒服一錢小兒五疳川棟子肉川芎窮等分為末聖惠方猪膽汁丸米飲下摘玄方

根及木皮氣味苦微寒微毒大明曰雄者根亦有毒吐瀉殺人不可誤服雌

者入服食每一兩可入糯米五十粒同煎殺毒若瀉者以冷粥止之不瀉者以熱葱粥發之主治

蛇蟲利大腸別錄苦酒和塗疥癬甚良景引治遊風熱毒

風癰惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗大明

附方舊二消渴有蟲少許水二椀煎至一椀空心飲

之雖困頓不妨下蟲如虬而紅色其渴自小兒虬蟲止消渴有蟲人所不知也洪邁堅志

棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之斗門方用為末米飲服二錢集簡方用根皮同雞卵煮熟空

心食之次日蟲下經驗方抵聖散用苦棟皮二兩白蕪荑半兩為末每以一二錢水煎服之簡便方

用棟根白皮去粗二斤切水一斗煮取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙以蟲下為度小兒

諸瘡惡瘡禿瘡蠅蠅瘡浸淫瘡並宜棟樹皮口中瘻或枝燒灰傳之乾者猪脂調千金方

瘡東行棟根細剉水煮濃汁日蜈蚣蜂傷棟樹枝葉日含漱吐去勿嚥肘后方蜈蚣蜂傷汁塗之良

簡便方楊起疥瘡風蟲棟根皮皂角去皮子等分為末猪脂調塗奇效方

花主治熱癰焙末摻之鋪席下殺蚤虱時珍

葉主治疝入囊痛臨發時煎酒飲時

珍

槐

本經上品

校正

併入嘉祐槐花槐膠

釋名櫟

音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三公位焉吳澄注云槐之言懷也懷來人於此也

王安石釋云槐黃中懷其美故三公位之春秋元命包云槐之言歸也古者樹槐聽訟其下使情歸實也

集解

別錄曰槐實生河南平澤可作神燭頌曰今處處有之其木有極高大者按爾雅槐有數種葉

大而黑者名櫟槐畫合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開黃花六月七月結實七月七日采嫩實搗汁作煎十月采老實入藥皮根采無時醫家用之最多時珍曰槐之生也季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成初生嫩芽可燉熟水淘過食亦可作飲代

茶或采槐子種畦中采苗食之亦良其木材堅重有青黃白黑色其花未開時狀如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中有黑子以子連多者為好周禮秋取槐檀之火淮南子老槐生火天玄主物簿云老槐生丹槐之神異如此藏器曰子上房七月收之堪染皂

槐實修治

穀曰凡采得去單子并五子者只取兩子三子者以銅鎚鎚破用烏牛乳浸一宿蒸

用過

氣味苦寒無毒

別錄曰酸鹹之才曰景天為之使

主治五內邪氣熱止

涎唾補絕傷火瘡婦人乳癰子臟急痛

本經

久服明目

益氣頭不白延年治五痔瘡癰以七月七日取之搗

汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅中日三易乃

愈又墮胎

別錄

治大熱難產

甄權

殺蟲去風合房陰乾煮

飲明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心

頭吐涎如醉瀆瀆如船車上者

藏器

治丈夫女人陰瘡

濕痒催生吞七粒

大明

疎導風熱

宗奭

治口齒風涼大腸

潤肝燥

李杲

發明

好古

曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃仁

同弘景曰槐子以十月己日米相連多者新盆
盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不
白而長生頌曰折嫩房角作湯代茗主頭風明目補

腦水吞黑子以變白髮扁鵲明目使髮不落法十月
上巳日取槐子去皮納新瓶中封口二七月初服一
枚再服二枚日加一枚至十日又從一枚起終而復
始令人可夜讀書延年益氣力大良時珍曰按太清
草木方云槐者虛星之精十月上巳日采子服之去
百病長生通神梁書言庾肩吾常服槐實年七十餘
髮鬢皆黑目看細字亦其驗也古方以子入冬月牛
膽中漬之陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通
神白髮還黑有痔及
下血者尤宜服之

附方 舊一 槐角丸 治五種腸風瀉血糞前有血名外
新四 槐角丸 痔糞後有血名內痔大腸不收名

脫肛穀道四面弩肉如爛名舉痔頭上有孔名瘻瘡
內有蟲名蟲痔並皆治之槐角去梗炒一兩地名榆當
歸酒焙防風黃芩枳殼麩炒各半兩為末酒糊
丸梧子大每服五十丸米飲下和劑局方 大腸

脫肛

槐角槐花各等分炒為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下猪腰子去皮蘸炙亦可

方內痔外痔

許仁則方用槐角子一斗搗汁晒稠取地膽為末同煎九梧子大每飲服十九

簾作挺子納下部或以苦參末代地膽亦可外臺秘要目熱昏暗槐子黃連二兩為末蜜丸

梧子大每漿水下二十丸日二服聖濟總錄大熱心悶槐子燒末酒服方寸匕千金方

槐花修治

宗奭曰未開時采收陳久者良入藥炒用染家以水煮一沸出之其稠滓為缺染色

更鮮也

氣味苦平無毒

元素曰味厚氣薄純陰也

主治五痔心痛眼赤殺

腹臟蟲及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研服大

涼大腸

素元

炒香頻嚼治失音及喉痺又療吐血衄崩

中漏下

時珍

發明

時珍曰槐花味苦色黃氣涼陽明厥陰血分藥也故所主之病多屬二經

附方

舊一新

衄血不止

槐花烏賊魚骨等半炒為末吹之

普濟方

衄出血

槐花末傳之即止

吐血不止

槐花燒存性入麝香少許研勻糯米

飲下

三錢

普濟方

咯血唾血下槐花炒研每服三錢糯米飲小

朱氏方

便尿血

槐花炒鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豉湯下立效

篋中秘密方

大腸下

血

經驗方用槐花荆芥穗等分為末酒服一錢匕集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服袖珍

用槐花枳殼等分炒存性為末新汲水服二錢暴熱下血生豬臟一條洗淨

填滿扎定米醋炒鍋內煮爛搗九彈子大日乾酒毒每服一丸空心當歸煎酒化下永類鈴方

下血槐花半生半炒一兩山梔子焙五錢藏毒下血為末新汲水服二服經驗良方

新槐花炒研酒服三錢日三服婦人漏血不止槐花或用槐白皮煎湯服普濟方

每服二三錢食前血崩不止槐花三兩黃芩二兩為溫酒下聖惠方末每服半兩酒一盞銅

秤錘一枚桑柴火燒紅浸入酒內調服忌口乾坤秘韞中風失音後仰臥嚼咽

得效方癰疽發背凡人中熱毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在

背後者即取槐花子一大抄鐵杓炒褐色以好酒一盞汗之乘熱飲酒一汗即愈如未退再炒一服極效

縱成膿者亦無不愈彭幸菴云此方楊梅毒瘡乃陽

三十年屢效者

劉松石保壽堂方

熱所生槐花四兩畧炒入酒二盞煎十外痔長寸槐

餘沸熱服胃虛寒者勿用也

集簡方

花煎湯頻洗并服之疔瘡腫毒一切癰疽發背不問

數日自縮

集簡方

已成未成但焮痛者

皆治槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸

熱服未成者二三服已成者一二服見效

醫方摘

要發背散血

槐花菜豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一盞露一夜調末三錢

傅之留頭勿犯婦女下血血崩槐花一兩椹灰五錢

手見攝生妙用方

鹽一錢水三鍾煎減

半服摘玄方白帶不止槐花炒牡蠣煨等分為末

每酒服三錢

取效

同上

葉氣味苦平無毒主治煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬

及丁腫皮莖同用

明大

邪氣產難絕傷及癰疹牙齒諸

風采嫩葉食

孟說

附方

舊二
新一

霍亂煩悶

槐葉桑葉各一錢
三分水煎服之

聖惠方

腸風

痔疾

用槐葉一斤蒸熟
曬乾研末煎飲代茶
久服明目

食醫心鏡鼻氣窒塞

以水
五升

煮槐葉取三升下葱豉
調和再煎飲千金方

枝氣味

同葉

主治洗瘡及陰囊下濕痒八月斷大枝候

生嫩藥煮汁釀酒療大風痿痺甚效

別錄

炮熱熨蠍毒

恭

青枝燒瀝塗癬煨黑指牙去蟲煎湯洗痔核頌燒

灰沐頭長髮

藏器

治赤目崩漏

時珍

發明

頌曰劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法甚詳以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其

上七壯以知為度王及素有痔疾充西川安撫使判官垂驟入駱谷其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺熱氣一道入腸中因大轉瀉先血後穢其痛甚楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳矣

附方

舊五新

風熱牙痛

槐枝燒熱烙之聖惠方

胎赤風眼

槐木枝如馬鞭

大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目日三度九種心痛

當太歲上取新生槐枝一握去兩頭崩用水三大升煎取一升頓服千金

中赤白

不問遠近取槐枝燒灰食前酒下
方寸匕日二服
深師方胎動欲產日

未足者取槐樹東引枝令孕婦
手把之即易生矣
子母秘錄陰瘡濕痒槐樹北面
不見日枝

煎水洗三五遍冷再
暖之
孟詵必效方

木皮根白皮氣味苦平無毒主治爛瘡喉痺寒熱

別錄

煮汁淋陰囊墜腫氣痛煮漿水漱口苗風疳蠱血

甄權

治中風皮膚不仁浴男子陰疝卵腫浸洗五痔一切

惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰

腫大煮汁服治下血

蘇頌

附方

舊二

中風身直

不得屈伸反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二

升稍稍服之

破傷中風

避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾灸皮上百壯不痛

者灸至痛痛者灸至不痛布裏之

普濟

風蟲牙痛

槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓入鹽

少許含漱

陰下濕痒

槐白皮炒煎水日洗生生方

痔瘡有蟲

或下

膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中

梅方 蠅虻惡瘡

槐白皮醋浸半日洗之 孫真人千金翼

槐膠氣味苦寒無毒主治一切風化涎肝臟風筋脉

抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如

蟲行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散凡煎
雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸嘉祐煨熟綿裹塞耳

治風熱聾閉

時珍

槐耳

見菜部
木耳

檀拾遺

釋名

時珍曰朱子云檀善木也
其字從宣以此宣者善也

集解

藏器曰按蘇恭言檀似秦皮其葉堪為飲樹體
細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大

水農人候之以占水旱號為水檀又有一種葉如檀
高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀樹其根如

也所在山谷有之藏器曰
生北土山林中皮堪為索


枝葉氣味甘苦平無毒主治三蟲下氣消穀煮汁和

米作粥飼小兒甚美

唐本

作粥灌六畜瘡中生蛆立出

藏器



本草綱目卷三十五上

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十五下

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士何思鈞

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣蔣厚傳

欽定四庫全書

本草綱目卷三十五下

明李時珍撰

木之二

喬木類三十四種
內附一種

秦皮

本經中品

校正

併入拾遺釋木

釋名枨皮

音

枨木

音

石檀

別錄

樊榧

弘景

盆桂

日華

苦樹

蘇恭

苦楮

時珍曰秦皮本作枨皮其木小而岑高故因以爲名人訛爲枨木又訛而爲秦木或云本出秦

地故得秦名也高誘注淮南子云柎苦樛木也
恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼爲苦樹

集解

別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八
月采皮陰乾弘景曰俗云是樊槐皮而水漬以

和墨書色不脫微青恭曰此樹似檀葉細皮有白點
而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是
真頌曰今陝西川郡及河陽亦有之其木大都似檀
枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而光並無花實根
似槐根俗呼爲白梲木

皮氣味苦微寒無毒

別錄曰大寒昔曰神農雷公
黃帝岐伯酸無毒李當之小

寒權曰平惡苦瓢防葵之才
曰惡吳茱萸大戟爲之使

主治風寒濕脾洗洗寒氣

除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身

本經

療男子少

精婦人帶下小兒癰身熱可作洗目湯久服皮膚

光澤肥大有子

別錄

明目去目中久熱兩目赤腫疼痛

風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗赤目極效

甄權

主熱痢下重下焦虛

好古

同葉煮湯洗蛇咬并研末

傳之

藏器

發明

弘景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素曰秦

皮沉也陰也其用有四治風寒濕邪成痺青白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫草同用治目病

以增光暈尤佳時珍曰梔皮色青氣寒味苦性溫乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收瀉也又能治男子少精益精有子皆取其瀉而補也故老子云天道貴瀉此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良爲可惋淮南子云梔皮色青治目之要藥也又萬畢術云梔皮止水謂其能收淚也

高誘解作致水言能使水沸者謬也

附方

舊三新三

赤眼生翳

秦皮一兩水一升半煮七合澄清日日溫洗一方加滑石黃連

等分

眼暴腫痛

秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八合食後溫服此乃

外臺秘

謝道人也

赤眼睛瘡

秦皮一兩清水一升白鹽中浸春夏一食頃以上看碧色

出即以筋頭纏綿仰卧點令滿眼微痛勿畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩日瘥也 外臺秘要

眼弦挑鍼

乃肝脾積熱剉秦皮夾沙糖水煎調大黃末一錢微利佳

血痢

連年

秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎取汁銅器重釜煎成丸如梧子大每服五六九日二服稍增

以止爲度亦可煎飲千金方

天蛇毒瘡

似癩非癩天蛇乃草間花蜘蛛也人被其螫爲露水

所濡乃成此疾以秦皮煮汁一斗飲之即瘥

寇宗奭本草

合歡

本經中品

釋名合昏

唐本

夜合

日華

青裳

圖經

萌葛

綱目

烏賴樹

頌曰

崔

注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也植之庭除使人不忿故嵇康養生論云台歡蠲忿萱草忘憂藏器曰其葉至暮即合故云合昏時珍曰按王璆百一選方云夜合俗名萌葛越人謂之烏賴樹又金光明經

謂之尸
利灑樹

集解

本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非療病

之功也恭曰此樹葉似皂莢及槐極細五月花發紅白色上有絲茸秋實作莢子極薄細所在山谷有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合昏頌曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂角極細而繁密互相交結每一風來輒自相解了不相牽綴采皮及葉用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醺暈綠上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合也嫩時煤熟水淘亦可食

木皮

去粗皮
炒用

氣味甘平無毒主治安五臟和心志令

人歡樂無憂久服輕身明目得所欲本經煎膏消癰腫

續筋骨

大明

殺蟲搗末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡

用葉洗衣垢

藏器

折傷疼痛研末酒服二錢匕宗和血

消腫止痛

時珍

發明

震亨曰合歡屬土補陰之功甚捷長肌肉續筋骨概可見矣與白蠟同入膏用神效而外科家

未曾錄用何也

附方

舊二新三

肺癰唾濁

心膈煩錯取夜合皮一掌大水三升煮取一半分二服韋宙

獨行方

撲損折骨

夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒黑色四兩芥菜子炒一兩爲末每服二錢

溫酒卧時服以滓傅之接
骨甚妙 王璆百一選方

髮落不生

合歡木灰二合
墻衣五合鉄精

一合水萍末二合研勻生油
調塗一夜一次 普濟方

小兒撮

口
夜合花枝濃
煮汁拭口中

并洗之
子母秘

錄中風攣縮

夜合枝 酒夜合枝 栢枝 槐枝 桑枝 石榴枝 各五兩 並生剉糯米

五升黑豆五升菴活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麴與

防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也 奇效良方

皂莢

本品

釋名皂角

雞栖子

綱目
烏犀

網目
懸刀

時珍曰莢之樹
皂故名廣志謂

之雞栖子曾氏方謂之烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰皂莢生雍州山谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月采莢陰乾弘景曰處處有之長尺

二者良俗人見其有虫孔而未嘗有虫形皆言不可近今人惡病殊不爾也其虫狀如草葉上青虫微黑便出所以難見恭曰此物有三種猪牙皂莢最下其形曲度薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷孟者爲勝木極有高大者本經用如猪牙者陶用尺二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以爲蔬茹更益人時珍曰皂樹高大葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者爲佳其樹多刺難上采時以篋籠其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生

缺三五斤泥封之即結英人以缺砧槌皂莢即自損
缺礪礪之久則成孔缺鍋費之多爆片落宜皂莢與

缺有感召

之情耶

皂莢修治

數曰凡使要赤肥并不蛀者以新汲水浸
一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙透槌

去子弦用每莢一兩用酥五錢好古曰凡

用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法

氣味辛鹹溫有小毒

好古曰入厥陰經氣分時珍曰
入手太陰陽明經氣分之才曰

栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參
苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃礪砂

主治風痺死肌

邪氣風頭淚出利九竅殺精物

本經

療腹脹滿消穀除

欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯

別錄通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃中風口噤

大明

破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中取盡其精煎成

膏塗帛貼一切腫痛

甄權

溽暑久雨時合蒼朮燒烟辟

瘟疫邪濕氣

宗真

燒烟熏久痢脫肛

汪機

搜肝風瀉肝氣

好古通肺及大腸氣治咽喉痺塞痰氣喘欬風癰疥

癰

時珍

發明

好古曰皂莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣散

內用皂莢引入厥陰也時珍曰皂莢屬金入于

太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風

木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上

下諸數服之則治風濕痰喘腫滿殺虫塗之則散腫
消毒搜風治瘡按龐安時傷寒總病論云元祐五年
自春至秋斬黃二郡人患急喉痺十死八九速者半
日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數
千人也其方治九種喉痺急喉痺纏喉風結喉爛喉
適虫虫蝶重舌木舌飛絲入口用大皂莢四十挺切
水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末
一兩煎至五升去滓入無灰酒一升釜煤二匕煎如
錫入瓶封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉
內取惡涎盡爲度後含甘草片又孫用和家傳秘寶
方云凡人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒
或口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮於
上胸痺氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥
實不蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩爲末每用
半錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便大

吐之恐過劑傷人累效不能書述宗真曰此法用皂
莢末一兩生礬末半兩兩臟粉半兩水調一二錢過咽
即吐涎用礬者
分膈下涎也

附方

舊二十新
三十六

中風口噤

不開涎潮壅上皂角一挺
去皮猪脂塗炙黃色爲末

每服一錢溫酒調下氣壯者二錢
以吐出血風涎爲度簡要濟衆方

中風口喎

皂角五
兩去皮

爲末三年大醋和之左喝塗右右
喝塗左乾更上之外臺秘要

中暑不省

皂莢一
兩燒存

性甘草一兩微炒爲末溫
水調一錢灌之澹寮方

鬼魘不寤

皂莢末刀圭吹
之能起死人

千金
自縊將死

皂莢末吹鼻
中外一方

水溺卒死

一宿者尚可
活紙裹皂莢

末納下部須臾出水
即活外臺秘要

急喉痺塞

遂巡不救皂莢生研
末每以少許點患處

外以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之亦良 直指方川皂角肉半截水醋半盞煎七分

破出濃血即愈 咽喉腫痛 牙皂一挺去皮米醋浸炙七次勿令大焦爲末每吹少許入咽吐涎

即止 聖 風癰諸痰 五癰膏治諸風肌痰如神大皂角半斤去皮子以蜜四兩塗上

慢火炙透槌碎以熱水浸一時接取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在夾綿紙上晒乾剪作紙花每用三

四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃芝麻餅一箇涎盡即愈立效 普濟

方 風邪癰疾 皂莢燒存性四兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧一兩爲末成丸梧子大硃砂

爲衣每服三四十丸素湯下日二服稍退只服二十九名抵住丸 永類方 一切痰氣 皂

燒存性蘿蔔子炒等分薑汁入煉蜜丸梧子大每服五七十丸白湯下 簡便方 胸中痰結

皂莢三十挺去皮切水五升浸一夜按取汁慢熬至可凡丸如梧子大每食後鹽漿水下十九又釣痰

膏用半夏醋煮過以皂角膏和勻入明礬少許以柿餅搗膏丸如彈子噙之聖惠方 欬逆上

氣唾濁不得卧皂莢丸用皂莢灸去皮子研末蜜丸梧子大每服一丸棗膏湯下日三夜一服張仲

景方 痰喘欬嗽 長皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用

薑汁制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙黃色爲末每用一字安手心臨卧以薑汁調之喫下神效

余居士 卒寒欬嗽 皂莢燒研豉湯服 牙病喘息 中

選奇方 水鷄鳴用肥皂莢兩挺酥炙取肉爲末蜜丸豆大每服一丸取微利爲度不利更服一日一服必效方

腫滿入腹 脹急皂莢去皮子灸黃爲末酒一斗二便 石器煮沸服一斗日三服 肘後方

關格

千金方用皂莢燒研粥飲下三錢立通宣明方缺脚丸用皂莢炙去皮子爲末酒麪糊丸每

服五十丸酒下

聖惠方用皂

食氣黃腫

氣喘胸滿用不蛀皂

莢燒烟于桶內坐上熏之即通

角去皮子醋塗炙焦爲末一錢巴豆七枚去油膜以

淡醋研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘皮湯

下日三服隔一日增一

胸腹脹滿

欲令瘦者猪牙皂角相續量長一尺

丸以愈爲度

經驗方

微火煨去皮子檮篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉

兩臠汁三兩口後以肉汁香藥十丸以快利爲度覺

得力更服以利清水即止藥瘥後一月不

身面卒腫

得食肉及猪油膩

崔元亮海上集驗方

洪滿用皂莢去皮炙黃剉三升酒一斗漬

卒熱勞疾

透煮沸每服一升一日三服

肘後方

皂莢續成一尺以上酥一大兩微塗緩炙酥盡搗篩

蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十九

重者不過兩劑愈

崔元亮海上方

急勞煩熱

體瘦三皂丸用皂莢皂莢樹皮皂莢刺各一斤

同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每

空心溫水下七

脚氣腫痛

皂角赤小豆爲末酒醋調貼腫處

傷

寒初得

水五合和頓服之陰病極效者燒赤爲末以

時

氣頭痛

煩熱用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和二錢服之先以煖水淋浴後服藥取

汗即愈

聖惠

卒病頭痛

皂角末吹鼻取

腦宣不止

不蛀皂角去皮

子蜜炙槌碎入水按取濃汁熬成膏噓鼻口內咬定良久涎出爲度

張子和儒門事親

通

皂角末吹之

風熱牙痛

皂角一挺去子入鹽滿殼仍加白礬少許黃泥固濟

煨研日擦之
相誠經驗方

風蟲牙痛

外臺秘要方用皂莢末塗齒上有涎吐之千金方

用猪牙皂角食鹽
等分爲末日指之

措牙烏鬚

大皂角二十挺以薑汁地黃汁蘸炙十遍爲末

日用措牙甚
妙普濟方

霍亂轉筋

皂角末吹豆許入鼻取嚏即安深師方

腸風下

血

用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研末精羊肉十兩細切搗爛和九梧子大每溫水下二十丸

聖惠大腸脫肛

不蛀皂角五挺槌碎水按取汁二升浸之自收上收後以湯盪其腰肚上下令

皂角氣行則不再作仍以皂角去皮酥炙爲末棗肉和丸米飲下三十丸

聖惠方下部匿瘡

皂莢燒研綿裹

外腎偏疼

皂角和皮爲末水調導之肘后方

便毒

腫痛

皂角炒焦水粉炒等分處頻以水潤之即效

又方用猪牙皂角七片

煨黃去皮弦出火毒爲末空
心溫酒服五錢 袖珍方 便毒癰疽 皂角一條醋

效 直 婦人吹乳 袖珍方用猪牙皂角去皮蜜炙爲
指方 末酒服一錢 又詩云婦人吹奶

法如何皂角燒灰蛤粉和熱酒
一盃調八字管教時刻笑呵呵 丁腫惡瘡 皂角去皮

未入麝香少許人糞少許和
塗五日後根出 普濟方 小兒頭瘡 粘肥及白禿

爲末去痂傅之不過三次
即愈 鄧筆鋒衛生雜典 小兒惡瘡 皂莢水洗拭乾

塗之 足上風瘡 作痒甚者皂角灸
肘後方 熟烙之 潘氏方 大風諸癩 長皂

十條灸去皮子以酒煎稠濾過候冷入雪
糕丸梧子大每酒下五十九 直指方 積年疥瘡

猪肚內放皂角炙熟去
皂角食之 袖珍方 射工水毒 生瘡皂莢長尺二

熬如飴塗之肘後方 咽喉骨哽猪牙皂角二條切碎生絹袋盛縫滿線縛項中立消 簡

便方 魚骨哽咽皂角末吹鼻取 九里蜂毒皂莢鑽孔貼叮處艾灸孔

上三五壯即安 救急方 腎風陰痒以稻草燒皂角烟熏十餘次即止 濟急仙方

子修治穀曰揀取圓滿堅硬不蛀者以瓶煮熟剝去硬皮一重取向裏白肉兩片去黃以銅刀切

晒用其黃消人腎氣 氣味辛溫無毒主治炒春去赤皮以水浸

軟煮熟糖漬食之疎道五臟風熱壅宗 核中白肉入

治肺藥核中黃心嚼食治膈痰吞酸蘇頌 仁和血潤腸

李杲治風熱大腸虛祕瘰癧腫毒瘡癰時珍

發明

機曰皂角核燒存性治大便秘結其性得濕則滑滑則燥結自通也時珍曰皂莢味辛屬金能

通大腸陽明燥金乃辛以潤之義非得濕則滑也

附方

舊三新一

腰脚風痛

不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥熬香爲末蜜

九梧子大每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十九

千金方

大腸虛秘

風人虛人脚氣人大

腸或秘或利用上方服至百丸以通爲度

下痢不止

諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色

屢驗皂角子瓦焙爲末米糊丸梧子大每服四五十丸陳茶下

醫方摘要

腸風下血

皂

子槐實一兩用占穀糠炒香去糠爲末陳粟米飲下一錢名神效散

聖惠方

裏急後重

不

皂角子米糠炒過枳殼炒等分爲末飯九梧子大每米飲下三十九

普濟方

小兒流涎

熱

有痰皂莢子仁半兩半夏薑湯泡七次一錢二分
爲末姜汁丸麻子大每溫水下五九 聖濟總錄 惡

水入口

及皂莢水入口熱痛不止以皂莢子燒存
性一分沙糖半兩和膏舍之 博濟方 婦

人難產

皂角子二枚吞
之 千金方

風蟲牙痛

皂角子末綿裹彈
子大兩顆醋煮熱

更互熨之日三
五度 聖惠方

粉滓面黥

皂角子杏仁等分研勻夜
以津和塗之 聖惠方

預免瘡櫛

凡小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子
可免瘡癰之患大人亦可吞七枚或二十

一枚林靜齋所傳方
也 吳昊扶壽方

便癰初起

皂角子七箇研末水
服效一方照年歲吞

之 儒門
事親方

一切丁腫

皂角子仁作
五日愈 千金方

年久瘰癧

阮氏經驗方用不蛀皂角子一百粒米醋一升礱砂
二錢同煮乾炒令酥看瘰癧子多少如一箇服一粒十

筒服十粒細嚼米湯下酒浸煮服亦可
聖濟總錄言虛人不可用硃砂也

刺

一名天丁

氣味辛溫無毒主治米醋熬嫩刺作煎塗瘡

癰有奇效

蘇頌

治癰腫妬乳風癰惡瘡胎衣不下殺蟲

時珍

發明

楊士瀛曰皂莢刺能引諸藥性上行治上焦病

震亨曰能引諸癰疽潰處甚驗時珍曰皂莢刺

治風殺虫功與莢同但其銳利直達病所爲異耳神

仙傳云左親騎軍崔言一旦得大風惡疾雙目昏盲

眉髮自落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用皂角

刺三斤燒灰蒸一時久日乾爲末食後濃煎大黃湯

調一匕飲之一旬眉髮再生肌潤目明後入山修道

不知所終又劉守真保命集云癰風乃營氣熱風寒

客于脉而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服一聖散用大黃末半兩煎湯調皂角刺灰三錢乃緩疎泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮下又追風再造散即一聖散云服之便出黑虫爲驗數日再服直候虫盡爲絕根也

新虫嘴赤
老虫嘴黑

附方

新十

小兒重舌

皂角刺灰入朴硝或腦子少許漱口摻入舌下涎出自消 聖

惠方小便淋閉

皂角刺燒存性破故紙等分爲末無灰酒服 聖濟總錄 腸風下血

便前近腎肝便後近心肺皂角刺灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各一兩爲末每服一錢米飲下 普

濟方傷風下痢

風傷久不已而下痢膿血日數十度用皂角刺枳實麩炒槐花生用各半兩爲

末煉蜜凡梧子大每服三十胎衣不下皂角刺燒爲末每服一錢

溫酒調下
熊氏補遺
婦人乳癰皂角刺燒存性一兩蚌粉一錢和研每服一錢溫酒下

直指
乳汁結毒產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荊子各燒存性等分爲末每溫酒服二

錢方
袖
腹内生瘡在腸臟不可藥治者取皂角刺不

其膿血悉從小便中出極效不飲
酒者水煎亦可
蘭氏經驗方
瘡腫無頭皂角刺

服三錢嚼葵子三五粒其處
如針刺爲效
儒門事親
癌癰惡瘡皂角刺燒存性研白及少

許爲末傳之
直指方
大風癰瘡選奇方用黃蘗末皂角刺灰各三錢研空心酒服取下蟲

物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效
散如四肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之

物取下虫大小長短其色不一約
一二升其病乃愈也 仁存方 發背不潰 皂角刺
麥蘖炒

黃一兩綿黃芪焙一兩甘草半兩爲末每服一大錢
酒一瓊乳香一塊煎七分去滓溫服 普濟本事方

木皮根皮氣味辛溫無毒主治風熱痰氣殺蟲 時珍

附方 新 肺風惡瘡 瘡痒用木乳即皂莢根皮秋冬采
如羅紋者陰乾炙黃白蒺藜炒黃

莖人參枳殼炒甘草炙等分爲 產後腸脫 不収用皂
末沸湯每服一錢 普濟方 角樹皮半

斤皂角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合
爲粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便

喫補氣丸藥一服
仰睡 婦人良方

葉主治入洗風瘡漂用 時珍

附錄鬼皂莢

藏器曰生江南驛畔狀如皂莢高一二尺作湯浴去風瘡疥癬按葉去衣垢沐

髮令長

肥皂莢

綱目

集解

時珍曰肥皂莢生高山中其樹高大葉如檀及皂莢葉五六月開白花結莢長三四寸狀如雲

實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不止圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟可食亦可種之十月采莢煮熟搗爛和白麴及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝于皂莢也相感志言肥皂莢水死金魚辟馬蝥蜚見之則不就亦物性然耳

莢氣味辛溫微毒主治去風濕下痢便血瘡癰腫

毒時珍

附方

新九

腸風下血

獨子肥皂燒存性一片爲末

普濟方

下痢

禁口

肥皂焚一枚以鹽實其內燒存性爲末以少許入白米粥內食之即效

風虛

牙腫

老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末摻之或入生樟腦十五

文家寶方

衛生頭耳諸瘡

眉癰燕窩瘡並用肥皂煨存性一錢枯礬一分研勻香油調塗

之方

小兒頭瘡

因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽海上

方臘梨頭瘡

不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆二枚扎定鹽泥包煨存性

入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗普濟方

癬瘡不愈

以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時搽之

楊起簡便方 便毒初

起

肥皂搗爛傳之甚效簡便方

玉莖濕癢

肥皂一箇燒存性香油調搽即愈攝生方

核氣味甘腥溫無毒主治除風氣

時珍

無患子

宋開寶

釋名桓

拾遺

木患子

綱目

噤婁

拾遺

肥珠子

綱目

油珠子

綱目

菩

提子

綱目

鬼見愁

藏器曰桓患字聲訛也崔豹古今注云昔有神巫曰瑤旣能符効百鬼得

鬼則以此木爲棒棒殺之世人相傳以此木爲器用以厭鬼魅故號曰無患人又訛爲木患也時珍曰俗名爲鬼見愁道家禳解方中用之緣此義也釋家取爲數珠故謂之菩提子與薏苡同名纂文言其木名

盧鬼木山人呼為肥珠子油珠子
因其實如肥油而子圓如珠也

集解

藏器曰無患子高山大樹也子黑如漆珠博物志云桓葉似檉柳葉核堅正黑如堅可作香纓

及浣垢宗奭曰令釋子取為念珠以紫紅色小者佳
入藥亦少西洛亦有之時珍曰生高山中樹甚高大
枝葉皆如椿特其葉對生五六月開白花結實大如
彈丸狀如銀杏及苦楝子生青熟黃老則文皺黃時
肥如油燦之形味辛氣腫且硬其蒂下有二小子相
粘承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠
殼中有仁如榛子仁亦辛腫可炒食十月采實煮熟
去核搗和麥麴或豆麴作澡藥去垢同于肥皂用洗
真珠甚妙山海經云袂周之山其木多桓郭璞注云
葉似柳皮黃不錯子似楝著酒中飲之辟惡氣浣之
去垢核堅正黑即此也令武當山中所出鬼見愁亦
是樹莢之子其形正如刀豆子而色褐彼人亦以穿

數珠別又是一
物非無患也

子皮

即核外肉也

氣味微苦平有小毒主治澣垢去面黚

喉痺研納喉中立開又主飛尸

藏器

附方

新

洗頭去風

明目

用槌子皮皂角胡餅菖蒲同槌碎漿水調作彈子大每用泡湯

洗頭良多能鄙事

洗面去黚

槌子肉皮搗爛入白麴和丸大

丸每日用洗面去垢及黚甚良

簡方

子中仁氣味辛平無毒主治燒之辟邪惡氣

藏器

煨食

辟惡去口臭

時珍

附方

一新

牙齒腫痛

肥珠子一兩 大黃 香附 各一兩 青
鹽半兩 泥固煨 研 日用擦牙 普

濟方

藥華

本經
下品

集解

別錄曰藥華生漢中川谷五月采恭曰此樹葉
似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸

漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也

五月六月花可以採南人以染黃甚鮮明又以療目赤

爛頰曰今南方及汴中國園間或有之宗奭曰長安

山中亦有之其子謂之木藥子携至京都爲數珠未

見入

藥

華氣味苦寒無毒

之才曰決
明爲之使

主治目痛淚出傷背消

目腫

本經

合黃連作煎療目赤爛

蘇恭

無食子

唐本草

釋名沒石子

開寶

墨石子

炮炙論

麻茶澤

玃曰波斯人每食以代果故番

胡呼爲沒食子梵書無與沒同音今人呼爲墨石沒石轉傳訛矣

集解

恭曰無食子生西戎沙磧間樹似檉禹錫曰按段成式酉陽雜俎云無食子出波斯國呼爲摩

澤樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白虫蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生拔屢子大如指長三寸上有股中仁如栗黃可噉時珍曰按方輿志云大食國有樹一年生如栗子而長名曰蒲盧子可食次年則生麻茶澤即沒石子也間歲互生一根異產

如此一統志曰沒石子出大食諸番樹如樟實如中國芋栗

子修治

穀曰凡使勿犯銅鉄并被火驚用顯小無杓米者妙用漿水於砂盆中研令盡焙乾再研

如烏犀色入藥

氣味溫苦無毒主治赤白痢腸滑生肌肉

唐本

腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰毒痿

燒灰用

李珣溫中治陰瘡陰汗小兒疳蠶冷滑不禁

馬志

發明

宗奭曰沒石子合他藥染鬚造墨家亦用之珣曰張仲景用治陰汗燒灰先以湯浴了布裹灰

撲之甚良

附方

舊三新五

血痢不止

沒石子一兩爲末飯丸小豆大每食前米飲下五十丸

普濟

方
小兒久痢

沒石子兩箇熬黃研末
作餛飩食之
官氣方

產後下痢

沒石子一

箇燒存性研末酒服熱即
用飲下日二

子母秘錄

牙齒疼痛

綿裹無食子末
一錢咬之涎出

吐去
聖

濟總錄

鼻面酒皴

南方沒石子有孔者水磨成膏
夜夜塗之甚妙
危氏得效方

口鼻急疳

沒石子末吹下部
即瘥
千金方

大小口瘡

沒石子炮三
分甘草一分

研末搽之月內小兒生者少許置乳上
吮之入口即啼不過三次
聖惠方

足趾肉刺

無食

子三枚肥皂莢一挺燒存性爲
末醋和傅之立效
奇效方

訶黎勒

唐本草

釋名訶子

時珍曰訶黎勒梵
言天主持來也

集解

恭曰詞黎勒生交州愛州頌曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木槵花白子形似卮子椒攬青

黃色皮肉相着七月八月實熟時采六路者佳嶺南異物志云廣川法性寺有四五十株子極小而味不瀋皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不醎每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸破之汲井水同煎色若新茶令其寺謂之乾明古寺尚在舊木猶有六七株南海風俗尚貴此湯煎煎之不必盡如昔時之法也訶子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之益小者佳彼人尤珍貴之蕭炳曰波斯舶上來者六路黑色肉厚者良六路即六稜也數曰凡使勿用訶黎勒今今訶頭也若訶黎勒文只有六路或多或少並是雜路勒皆圓而露文或八路至十三路號曰榔精勒瀋不堪用

修治

斲曰凡用訶黎勒酒浸後蒸一伏時刀削去皮取肉剉焙用用核則去肉

氣味苦溫

無毒

權曰苦甘炳曰苦酸琇曰酸溫溫好古曰苦酸平苦重酸輕味厚陰也降也

主治冷

氣心腹脹滿下食

唐本

破胸膈結氣通利津液止水道

黑髭髮

甄權

下宿物止腸澼久洩赤白痢

蕭炳

消痰下氣

化食開胃除煩治水調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔

豚腎氣肺氣喘急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕

漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人肛門急痛產

婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗

大明

治痰嗽咽喉

不利含三數枚殊勝蘇實大腸欽肺降火

震亨

發明

宗真曰訶黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖瀉腸而又泄氣其味苦瀉故爾果曰肺苦

氣上逆急食苦以泄之以酸補之訶子苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用震亨曰訶子下氣以其味苦而性急肺苦急急食苦以瀉之謂降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難輕服又治肺氣因火傷極遂一過脹滿其味酸苦有收斂降火之功也時珍曰訶子同烏梅五倍子用則收斂同橘皮厚朴用則下氣同人參用則能補肺治咳嗽東垣云嗽藥不用者非矣但欬嗽未久者不可驟用爾嵇含草木狀言作飲久服令髭髮白者變黑亦取其瀉也珣曰訶黎皮主嗽肉主眼瀉痛波斯人將訶黎勒大腹等在舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里船不能通乃煮此洗其涎滑尋化為水則其治氣消痰功力可

知矣 慎微曰金光明經言流水長者除病品云熱
病下藥服訶黎勒又廣異記云高仙芝在大食國得
訶黎勒長三寸置抹肚下便覺腹中痛因大痢十餘
行疑訶黎勒爲祟後問火食長老云此物人帶一切
病消利者乃出惡物爾仙芝寶之後被誅失所在
頌曰訶黎主痢唐本草不載張仲景治氣痢有方唐
劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服過久不瘥
轉爲白膿令狐將軍傳此方用訶黎勒三枚兩炮一
生並取皮末之以沸漿水一合服之若只水痢加一
錢匕甘草末若微有膿血加三七血多亦加三七
附方 舊九 下氣消食 訶黎一枚爲末瓦器中水一大
新六 煎三兩沸下藥更煎三五沸
如麴塵色入少鹽 一切氣疾 宿食不消訶黎一枚入
飲之 食醫心鏡 夜含之至明嚼嚥 又
方訶黎三枚濕紙包煨熟去 氣嗽日久 生訶黎一枚
核細嚼以牛乳下 千金方 含之嚥汁瘥

後口爽不知食味却煎檳榔湯一盃服立嘔逆不食

便有味此知連州成密方也經驗方

訶黎勒皮二兩炒研糊九梧子大空風痰霍亂食不

心湯服二十九日三服廣濟方

便瀉訶黎三枚取皮爲末和酒小兒霍亂訶黎一枚

頓服三五次妙外臺秘要

服一半未止再服小兒風痰壅閉語音不出氣促喘悶

服子母秘錄

去核大腹等皮分水煎服風熱衝頂熱悶訶黎二枚

名二聖散全幼心鑑

同入醋中攪令消磨氣痢水瀉訶黎勒十枚麴糵煨

塗熱處外臺秘要

飲頓服亦可飯丸服一加木香又長服方訶黎勒

陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每服二三

十丸白湯下水瀉下痢訶黎勒炮二分肉豆蔻一分

圖經本草

爲末米飲每服二錢聖惠

方
下痢轉白

訶子三箇二炮一生爲末沸湯調服水痢加甘草末一錢

赤白

下痢

訶子十二箇六生六煨去核焙爲末赤痢生甘草湯下白痢炙甘草湯下不過再服

趙原陽

濟急

妬精下疳

大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃蘗甘草馬

鞭草葱白煎湯洗亦可昔方士周守真醫唐靖爛莖一二寸用此取效也

洪邁夷堅志

核主治磨白蜜注目去風赤痛神良

蘇頌

止欬及痢

時珍

葉主治下氣消痰止渴及洩痢煎飲服功同訶黎

時珍

唐包佶有病中謝李

吏部惠訶黎勒葉詩

婆羅得

宋開寶

釋名婆羅勒

時珍曰婆羅勒得梵言重生果也

集解

珣曰婆羅勒得生西海波斯國樹似中華柳樹子如葦麻子方家多用之時珍曰按王壽外臺秘

要婆羅勒似葦麻子但以指甲介之則有汁出即此物也

子氣味辛溫無毒主治冷氣塊溫中補腰腎破瘰癧

可染髭髮令黑

藏器

附方一拔白生黑

婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬚膏煉過一兩生薑炒一兩

母丁香半兩爲末和煎每拔白點之指令入肉即生黑者此嚴中丞所用方也

孟詵近效方

櫟別錄

下品

釋名櫟柳衍義鬼柳時珍曰其樹高舉其木如柳故名

柳云似柳皮可煮飲也

集解

弘景曰櫟樹山中處處有之皮似檀槐葉如櫟

似櫟而狹長樹大者連抱高數仞皮極粗厚殊不似檀宗奭曰櫟木令人呼爲櫟柳其葉謂柳非柳謂槐非槐最大者木高五六丈合二三人抱湖南北甚多然亦不材也不堪爲器嫩皮取以緣栲栳及箕唇時珍曰櫟材紅紫作箱案之類甚佳鄭樵通志云櫟乃榆須而枝烈其實亦如榆錢之狀鄉人采其葉爲甜茶

木皮修治

斲曰凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者良

剝下去粗皮細剝蒸之
從已至未出焙乾用

氣味苦大寒無毒主治時行頭痛熱結在腸胃別錄夏

日煎飲去熱弘景俗用煮汁服療水氣斷痢蘇恭安胎止

妊婦腹痛山櫟皮性平治熱毒風燔腫毒大明

附方舊一通身水腫櫟樹皮煮汁日毒氣攻腹手足

櫟樹皮和櫟皮煮汁煎如飴糖聖惠方蠱毒下血櫟皮一尺

水二升煮一升頓服肘後方小兒痢血梁州櫟皮二十分炙

當下蠱出千金方飛血赤眼櫟皮去粗皮切二兩

煮取一升分三服取飛血赤眼古錢七文水一升半

煎七合去滓熟洗日
二次 聖濟總錄

葉氣味苦冷無毒主治接貼火爛瘡有效

蘇恭

治腫爛

惡瘡鹽搗罾之

大明

柳

本經
下品

釋名小楊

說文

楊柳

弘景曰柳即今水楊柳也恭曰柳與水楊全不相似水楊葉圓潤而

火枝條短硬柳葉狹長而青綠枝條長軟陶以柳為水楊非也藏器曰江東人通名楊柳北人都不言楊楊樹枝葉短柳樹枝葉長時珍曰楊枝硬而揚起故謂之楊柳枝弱而垂流故謂之柳蓋一類二種也蘇恭所說為是按說文云楊蒲柳也從木易聲柳小楊也從木弅聲易音陽弅音酉又爾雅云楊蒲柳也旄

澤柳也。檉河柳也。觀此則楊可稱柳。柳亦可稱楊。故今南人猶併稱楊柳。余宗本種樹書言順揀為柳倒揀為楊。其說牽強且失。楊起之意。宗奭曰：釋家謂柳為尼俱律陀木。

集解

別錄曰：柳華生琅邪川澤。頌曰：今處處有之。俗所謂楊柳者也。其類非一。蒲柳即水楊也。枝勁

韌，可為箭筈，多生河北。杞柳生水旁，葉粗而白，木理微赤，可為車轂。今人取其細條，火逼令柔，屈作箱篋。孟子所謂杞柳為栲者，魯地及河朔尤多。檉柳見本條。時珍曰：楊柳縱橫倒順，揀之皆生。春初生柔荑，即開黃蕊花。至春晚，葉長成，後花中結細黑子，蕊落而絮出，如白絨。因風而飛，子著衣物，能生虫，入池沼即化為浮萍。古者春取榆柳之火，陶朱公言種柳千樹可足柴炭，其嫩芽可作飲湯。

柳華釋名柳絮

本經

正誤

見下

氣味苦寒無毒主治風水

黃疸面熱黑

本經

痂疥惡瘡金瘡柳實主潰癰逐膿血

子汁療渴

別錄

華主止血治濕痺四肢攣急膝痛

甄權

發明

弘景曰柳花熟時隨風狀如飛雪當用其未舒時者子亦隨花飛止應水漬汁兩藏器曰本經

以柳絮爲花其誤甚矣花即初發時黃蕊其子乃飛絮也承曰柳絮可以捍鹽代羊毛爲茵褥柔軟性涼宜與小兒卧尤佳宗真曰柳花黃蕊乾時絮方出收之貼灸瘡良絮之下連小黑子因風而起得水濕便生如苦買地丁之花落結子成絮古人以絮爲花謂花如雪者皆誤矣藏器之說爲是又有實及子汁之大諸家不解今人亦不見用時珍曰本經主治風水黃疸者柳花也別錄主治惡瘡金瘡潰癰逐膿血藥性論止血療痺者柳絮及實也花乃嫩蕊可搗汁服子與絮連難以分別惟可貼瘡止血裒痺之用所謂

子汁療渴者則連絮浸漬研汁服之爾又崔寔四民月令言三月三日及上除日采絮愈疾則入藥多用也

附方

新

吐血咯血

柳絮焙

研米飲服

一錢

經驗方

金瘡血出

柳絮

封之

即止

外

面上膿瘡

柳絮膩粉等

分以燈

蓋油調塗

普濟方

走馬牙疳

楊花燒存性入麝香

少許搽

保幼大全

大風癰瘡

楊花四兩搗成餅貼

壁上待乾取下米泔

水浸一時取起瓦焙研末二兩白蛇烏蛇各一條

去頭尾酒浸取肉全蠍蜈蚣蟾酥雄黃各五錢苦參

天麻各一兩爲末水煎麻黃取汁熬膏和九梧子大

硃砂爲衣每服五十九溫酒下一日三服以愈爲度

效良方

孫氏集

脚多汗濕

楊花着鞋及襪

內穿之

摘玄

葉氣味

同華

主治惡疥痂瘡馬疥煎煮洗之立愈又療

心腹內血止痛

別錄

煎水洗漆瘡

弘景

天行熱病傳尸骨

蒸勞下水氣煎膏續筋骨長肉止痛主服金石人發

大熱悶湯火瘡毒入腹熱悶及丁瘡

日華

療白濁解丹

毒

時珍

附方

舊一

小便白濁

清明柳葉煎湯代茶

小兒丹煩

柳葉一斤水一斗煮取汁三升

楊

洗赤處日七八度

子母秘錄

眉毛脫落

垂柳葉

陰乾爲

末每薑汁于鉄器中調

夜夜摩之

聖惠方

卒得惡瘡

不可名識者柳葉或皮水煮汁入少

鹽頻洗之面上惡瘡方上痘爛生蛆嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出而

愈也 李

樓奇方

枝及根白皮氣味同主治痰熱淋疾可為浴湯洗風

腫癢痒煮酒漱齒痛蘇小兒一日五日寒熱煎枝浴

之藏器煎服治黃疸白濁酒煮熨諸痛腫去風止痛消

腫時珍

發明頌曰柳枝皮及根亦入藥葛洪肘後方治癰疽腫毒如乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反

花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥牙齒藥亦用其枝為最要之藥時珍曰柳枝去風消腫止

痛其嫩枝削爲
牙杖滌齒甚妙

附方

舊十
新八

黃疸初起

柳枝煮濃汁半升
頓服外臺秘要

脾胃虛弱

不思

飲食食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳枝一大
把焚湯煮小米作飯酒麵滾成珠子晒乾袋懸風處
每用燒滾水隨意下米米沉住火少時米浮取看無
硬心則熟可頓食之久則麪散不粘矣名曰絡索米

楊起

走注氣痛

氣痛之病忽有一處如打撲之狀
簡便方不可忍走注不定靜時其處冷如

霜雪此皆暴寒傷之也以白酒煮楊柳白皮暖熨之
有赤點處饒去血妙凡諸卒腫急痛熨之皆即止

姚增坦

風毒卒腫

方同

陰卒腫痛

柳枝三尺長二十
枚細剉水煮極熟

集驗方

以故帛裹包腫處仍以
熱湯洗之集驗方

項下癭氣

水涯露出柳根三
十斤水一斛煮取

五升以糯米三斗如常
釀酒日飲 范汪方

齒齲腫痛

垂柳枝槐白皮桑
白皮白楊皮等分

煎水熟含冷吐
膏入薑汁細辛芎藭末

又方柳枝槐枝桑枝煎水熬
每用擦牙

聖惠方

風蟲

牙痛

楊柳

白皮卷如指大含咀以汁漬齒根數過即
又方柳枝一握剉入少鹽花漿水煎含甚

驗

又方柳枝剉一升大豆一升合炒豆熟瓷器盛

之清酒三升漬三日頻含漱涎三日愈

古今錄驗

耳痛有膿

柳根細切熟搗封之
柳根細切熟搗封之

斗門方

漏瘡腫痛

柳根紅鬚
煎水日洗

摘玄方用楊柳條罐

乳癰妬乳

初起堅紫衆療不
瘥柳根皮熟搗火

內燒烟熏之出水即效
溫帛裹熨之冷更易

翻花惡瘡

肉出如飯粒根深膿
潰柳枝葉三斤水五

一宿消 肘後方

外煎汁二升熬如錫
日三塗之 聖惠方

天竈丹毒

赤從背起柳木灰水
調塗之 外臺秘要

湯火灼瘡

柳皮燒灰塗之亦可以根白
皮煎猪脂頻傅之

痔瘡如瓜

腫痛

如火柳枝煎濃湯洗之艾灸三五壯王及郎中病此
驛吏用此方灸之覺熱氣入腸大下血穢至痛一頃

遂消馳馬而去
本事方

柳膠主治惡瘡及結砂子

時珍

柳寄生

見後寓
木類

柳耳

見菜部
木耳

柳蠹

見虫
部

檉柳

音偵
宋開寶

釋名赤楊

華

赤楊

注

今

河柳

爾雅

雨師

詩疏

垂絲柳

目

人

柳

綱目

三眠柳

義

觀音柳

時珍

曰

按

羅

願

爾雅

翼云

天

應

又

負

霜

雪

不

凋

乃

木

或

曰

得

雨

則

垂

垂

如

絲

當

作

兩

絲

三

輔

故

事

云

漢

武

帝

苑

中

有

柳

狀

如

人

號

曰

人

號

曰

人

柳

一

日

三

起

三

眠

則

柳

之

聖

又

不

獨

知

雨

負

雪

而

已

今

俗

稱

長

亦

曰

觀

音

柳

謂

觀

音

用

此

酒

水

也

宗

真

曰

令

人

謂

之

三

春

柳

以

其

一

年

三

秀

集解

志曰

赤

柳

木

生

河

西

沙

地

皮

赤

色

細

葉

禹

錫

曰

爾雅

柳

河

旁

赤

莖

小

楊

也

陸璣

詩

疏

云

生

水

旁

皮

赤

如

絳

枝

葉

如

松

時

珍

曰

柳

小

幹

弱

枝

插

之

易

生

年

三

次

作

花

花

穗

長

三

四

寸

水

紅

色

如

蓼

花

色

南

齊

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

蜀

柳

條

長

狀

若

絲

縷

者

即

此

柳

也

段

成

式

時

益

州

獻

酉陽雜俎言涼州有赤白檉大者爲炭其灰汁可以煮銅故沈炯賦云檉似栢而香王禎農書云山柳赤而脆河柳白而明則檉又有白色者也宗奭汴京甚多河西或人取滑枝爲鞭

木氣味甘鹹溫無毒主治剝驢馬血入肉毒取木

片火炙熨之并煮汁浸之

開寶

枝葉消痞解酒毒利

小便

時珍

附方

新三

腹中痞積

觀音柳煎湯露一夜五更空心飲數次痞自消

衛生易簡方一

切諸風

不問遠近檉葉半斤切枝亦可荆芥半斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合新

瓶盛之油紙封入重湯煮一伏時每服一小盞日三服

普濟方

酒多致病

長壽仙人柳晒

乾爲末每服一錢溫酒

調下 衛生易簡方

檉乳

即脂汁

主治合質汗藥治金瘡

開寶

水楊

唐本草

釋名青楊

綱目

蒲柳

爾雅

蒲楊

古今注

蒲移

音移

移柳

古今注

隤

苻

音丸蒲時珍曰楊枝硬而楊起故謂之楊多宜水渼蒲隤之地故有水楊蒲柳隤苻之名

集解

菰曰水楊葉圓潤而尖枝條短硬與柳全別柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其枝勁

韌可爲箭苻左傳所謂董澤之蒲又謂之隤苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多隤約古今注云白楊

葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢赤楊霜降則葉

赤材理亦赤然令人鮮能分別機曰蘇恭說水楊葉圓潤雀豹說蒲楊似青楊青楊葉長似不相類時珍曰按陸璣詩疏云蒲柳有二種一種皮正青一種皮正白可爲矢北土尤多花與柳同

枝葉氣味苦平無毒主治久痢赤白搗汁一升服日

二大效

唐本

主癰腫痘毒

時珍

發明

時珍曰水楊根治癰腫故近人用枝葉治痘瘡魏直博愛心鑑云痘瘡數日陷頂漿滯不行或

風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴痘不行漿乃氣溢血滯膜理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖

氣而發行漿貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此升之其效更速風寒亦不得而阻之矣直見一蠶在村中用此有驗即得其方行之百發百中慎勿易之誠有燮理之妙也蓋黃鍾一動而蟄蟲啟戶東風一吹而堅冰解腹同一春也羣書皆無此法故詳著之

木白皮及根氣味

同華

主治金瘡痛楚乳癰諸腫瘡

時珍

發明

時珍曰按李仲南永類鈐方云有人治乳癰持藥一根生搗貼瘡其熱如火再貼遂平求其方

乃水楊柳根也葛洪肘后方治乳癰用柳根則楊與柳性氣不遠可通用也

附方

一新

金瘡苦痛

楊木白皮熬燥碾末水服方寸七仍傳之日三次千金方

白楊

唐本草

釋名獨搖

宗奭曰木身似楊微白故曰白楊非如粉之白也時珍曰鄭樵通志言白楊一名高

飛與移楊同名今俗通呼移楊爲白楊且白楊亦因風獨搖故得同名也

集解

恭曰白楊取葉圓大蒂小無風自動者藏器曰白楊北土極多人種墟墓間樹大白其無風

自動者乃移楊非白楊也頌曰今處處有之北土尤多株甚高大葉圓如梨葉皮白色木似楊采無時崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長是也宗奭曰陝西甚多永耀間居人修蓋多此木也其根不時碎札入土即生根故易繁植土地所宜爾風纔至葉如大雨聲謂無風自動則無此事但風微時其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂長葉重大勢使然也時珍曰白楊木高大葉圓似梨而肥大有尖面青而光背甚白色

有鋸齒木肌細白性堅直用爲梁拱終不撓曲與杉楊乃一類二種也治病之功大抵彷彿嫩葉亦可救荒老葉可作酒麴料

木皮修治

數曰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從已至未以布袋盛掛屋東角待乾用

氣味苦寒無毒

大明曰酸冷

主治毒風脚氣腫四肢緩弱

不隨毒氣游易在皮膚中痰癖等酒漬服之

唐本去風

痺宿血折傷血滯在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙

腫雜五木爲湯浸損處

藏器

治撲損瘀血並煎酒服煎

膏可續筋骨

大明

煎湯日飲止孕痢煎醋含漱止牙痛

煎漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒消瘰氣時珍

附方

舊一

妊娠下痢

白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服

千金方

項下

瘰氣

秫米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮取二升漬麴末五兩如常釀酒每

旦一盞日再服
崔氏方

枝主治消腹痛治吻瘡

時珍

附方

舊二

口吻爛瘡

白楊嫩枝鐵上燒灰和

外臺秘要

腹滿癖

堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓

還納酒中密封再宿每服一合日三服

面色不白

白楊皮十八兩桃花一兩白瓜

子仁三兩爲末每服方寸七日三服
五十日面及手足皆白 聖濟總錄

葉主治齧齒煎水含漱又治骨疽久發骨從中出頻

擣傳之

時珍

扶移

音夫移
拾遺

釋名移楊

古今注

唐棣

爾雅

高飛

崔豹

獨搖

時珍

曰移乃白

名按爾雅唐棣移也崔豹曰移楊江東呼爲夫移圓
葉弱蒂微風則大搖故名高飛又曰獨搖陸璣以唐

棣爲郁李者誤矣郁
李乃常棣非唐棣也

集解

藏器曰扶移木生江南山谷樹大十數圍無風
葉動花反而後合詩云唐棣之華偏其反而是

也時珍曰移楊與白楊是同類二種今南人通呼爲白楊故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語其入藥之功大抵相近

木皮氣味苦平有小毒主治去風血脚氣疼痺腕損瘀血痛不可忍取白皮炙酒浸服之和五木皮煮湯

捋脚氣殺瘰癧風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗

藏器

發明

時珍曰白楊移楊皮並雜五木皮煮湯浸捋損痺諸痛腫所謂五木者桑槐桃楮柳也並去風

和血

附方

新婦人白崩

扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煨各一兩每用一兩酒二鍾煎

本草綱目

一鍾食前服

集簡方

松楊

拾遺

校正

併入唐本草
松子木

釋名
棕子木

音涼時珍曰其材如松其身如楊故名
松楊爾雅云棕即來也其陰可蔭涼故

曰棕木藏器曰江西人呼
爲涼木松楊縣以此得名

集解

藏器曰松楊生江南林落間大樹葉如梨志曰
棕子木葉似柿兩葉相當子細圓如牛李生青

熟黑其木堅重煮汁色赤郭璞云棕
材中車輞八月九月采木日乾用

木氣味甘鹹平無毒主治折傷破惡血養好血安胎

止痛生肉

唐本

木皮氣味苦平無毒主治水痢不問冷熱濃煎令黑

服一升

藏器

榆

俞由二音
本經上品

釋名零榆

本經

白者名粉

時珍曰按王安石字說云榆
藩俞柔故謂之榆其粉則有

分之道故謂之粉
其莢飄零故曰零榆

集解

別錄

曰榆皮生潁川山谷二月采皮取白暴乾
八月采實並勿令中濕濕則傷人弘景曰此即

今之榆樹取皮刮去上赤皮亦可臨時用之性至滑
利初生莢仁以作糜羹令人多睡嵇康所謂榆令人
瞑也恭曰榆三月實熟尋即落矣今云八月采實恐
誤也藏器曰江東無大榆有刺榆秋實故經云八月

采者誤也刺榆皮不滑利頌曰榆處處有之二月生
莢古人采仁以爲糜羹今無復食者惟用陳老實作
醬耳按爾雅疏云榆類有數十種葉皆相似但皮及
木理有異耳刺榆有針刺如柘其葉如榆淪爲蔬羹
滑于白榆即爾雅所謂樞莖詩經所謂山有樞是也
白榆先生葉却着莢皮色白二月剝皮刮去粗散中
極滑白即爾雅所謂榆白粉是也荒歲農人取皮爲
粉食之當糧不損人四月采實宗奭曰榆皮初春先
生莢者是也嫩時收貯爲羹茹嘉祐中豐沛人缺食
多用之時珍曰邢昺爾雅疏云榆有數十種今人不
能盡別惟知莢榆白榆刺榆棚榆數者而已莢榆白
榆皆大榆也有赤白二種白者名粉其木甚高大未
生葉時枝條間先生榆莢形狀似錢而小色白成串
俗呼榆錢後方生葉似山茱萸葉而長尖艸潤澤嫩
葉燦浸淘過可食故內則云莖莖粉榆兔藁滌瀝以
滑之三月采榆錢可作羹亦可收至冬釀酒淪過晒

乾可爲醬即榆仁醬也崔寔月令謂之醬醢昔牟倫者是也山榆之莢名蕪蕪與此相近但味稍苦耳諸榆性皆扇地故其下五穀不植古人春取榆火今人采其白皮爲榆麴水調和香劑粘滑勝于膠漆承曰榆皮濕搗如糊用粘瓦石極有力汴洛人以石爲碓甯用此膠之

白皮氣味甘平滑利無毒主治大小便不通利水道

除邪氣久服斷穀輕身不饑其實尤良經本療腸胃邪

熱氣消腫治小兒頭瘡痂疔別錄通經脉搗涎傳癰瘡

大滑胎利五淋治齁喘療不眠甄權生皮搗和三年醋

滓封暴患赤腫女人妬乳腫日六七易效孟詵利竅滲

濕熱行津液消癰腫

時珍

發明

說曰高昌人多搗白皮爲末和菜菔食甚美令人能食仙家長服服丹石人亦服之取利闕節

故也時珍曰榆皮榆葉性皆滑利下降手足太陽經陽明經藥也故入小便不通五淋腫滿喘嗽不眠經脉胎產諸證宜之本草十劑云滑可去著冬葵子榆白皮之屬蓋亦取其利竅滲濕熱消留著有形之物爾氣盛而壅者宜之若胃寒而虛者久服滲利恐洩真氣本經所謂久服輕身不飢蘇頌所謂榆粉多食不損人者恐非確論也

附方

舊九新九

斷穀不饑

榆皮檀皮爲末日服數合

救荒本草

勦喘不止

榆白皮陰乾焙爲末每日旦夜用水久嗽欲死許明五合末二錢煎如膠服食療本草則有

效方用厚榆皮削如指大長尺餘納喉中頻出入當吐膿血而愈
虛勞白濁 榆

皮二分水三斗煮取五
小便氣淋 榆枝石燕子煎水
升分五服 千金方 普濟方

五淋澀痛 榆白皮陰乾焙研每以二錢水
五合煎如膠日二服 普濟方 **渴而尿多**

非淋也用榆皮二片去黑皮以水一斗煮
取五升一服三合日三服 外臺秘要 **身體暴腫**

榆皮搗末同米作粥食
之小便良 備急方 **臨月易產** 榆皮焙爲末臨月
服方寸匕令

產極易 陳
承本草別說 **墮胎下血** 不止榆白皮當歸焙各半兩
入生薑水煎服之 普濟方

胎死腹中 或母病欲下胎榆白皮煮
汁服二升 子母秘錄 **身首生瘡** 榆白
皮末

油和塗之虫當
出 子母秘錄 **火灼爛瘡** 榆白皮嚼塗
之 千金髓 **五色丹毒** 俗
名

遊腫犯者多死不可輕視以榆
白皮末鷄子白和塗之 千金 小兒蟲瘡 榆皮末和

上覆之虫出立 癰疽發背 榆根白皮切清水洗搗極
瘡 千金方 爛和香油傳之雷頭止氣

燥則以苦茶頻潤不粘更換新者將愈以桑葉
嚼爛隨大小貼之口合乃止神效 救急方 小兒

瘰癧 榆白皮生搗如泥封 小兒禿瘡 醋和榆白皮末
之頻易 必效方 塗之虫當出

產乳
方

葉氣味 上同 主治嫩葉作羹及燂食消水腫利小便下

石淋壓丹石 藏器時珍曰暴乾爲末淡鹽水拌或煎
炙或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣

汁洗酒皸鼻同酸棗仁等分蜜丸日服治膽熱虛

勞不眠

時珍

花主治小兒癩小便不利傷熱

別錄

莢仁氣味辛平無毒主治作糜羹食令人多睡

弘景

主婦人帶下和牛肉作羹食

藏器

子醬似蕪荑能助肺

殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛塗諸

瘡癰以陳者良

孟詵

榆耳

見木耳

桐榆

拾遺

集解

藏器曰榧榆生山中狀如榆其皮有滑汁秋生莢如大榆時珍曰大榆二月生莢榧榆八月生

莢可

分別

皮氣味甘寒無毒主治下熱淋利水道令人睡藏器治

小兒解顱

時珍

蕪荑

別錄中品

釋名莖荑

爾雅

無姑

本經

葭塘

音殿唐

木名榧

音偏按說文云榧

時珍曰

山枌榆也有刺實爲蕪荑爾雅云無姑其實莖又云蕪荑葭塘則此物乃莖樹之莖故名也恭曰葭塘乃

葭塘二

字之誤

集解

別錄曰蕪荑生晉山川谷三月采實陰乾弘景曰今惟出高麗狀如榆莢氣臭如玃彼人皆以

作醬食之性殺虫置物中亦辟蛭但患其臭恭曰今延州同州者甚好志曰河東西處處有之頌曰近道亦有之以太原者良大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃大氣臭郭璞爾雅注云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也采實陰乾用令人又多取作屑以芼五味惟陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味但宜食品不堪入藥玃曰按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也藏器曰蕪荑氣羶者良乃山榆仁也時珍曰蕪荑有大小兩種小者即榆莢也揉取仁醞爲醬味尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種

氣味辛平無毒

權曰苦平玃曰辛溫說曰作醬甚香美功尤勝于榆仁可少食之過多發

熱爲辛故也秋
月食之尤宜人

主治五內邪氣散皮膚骨節中淫淫

溫行毒去三蟲化食

本經

逐寸白散腸中噓噓喘息

別錄

主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行

本蜀

五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中惡蟲毒諸病

不生

孟詵

治腸風痔瘻惡瘡疥癬

大明

殺蟲止痛治婦人

子宮風虛孩子疳瀉冷痢得訶子豆蔻良

李珣

和豬脂

搗塗熱瘡和蜜治濕癬和沙牛酪或馬酪治一切瘡

張鼎

附方

新七

脾胃有蟲

食即作痛面黃無色以石州蕪荑仁二兩和麴炒黃色爲末非

時米飲服二錢

制殺諸蟲

生蕪荑生檳榔各四兩爲末蒸餅九梧子大每服二

十凡白湯下

疳熱有蟲

瘦悴久服充肥用榆仁一兩黃連一兩爲末猪胆汁七枚

和入盞內飯上蒸之一日蒸一次九蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和凡綠豆大每服五七九至一二十九

米飲下

錢小兒蟲癩

胃寒虫上諸證危惡與癩相似用白蕪荑乾漆燒存性等

分爲末米飲調服一

結陰下血

蕪荑一兩搗爛紙壓去油爲末以雄猪膽

汁九梧子大每服九九甘草湯下日五服三日斷根

脾胃氣泄

久患不止蕪荑五兩

搗末飯九梧子大每日空心午飯前陳米飲下三十丸久服去三尸益神駐顏此方得之章錄曾用得力

王紹顏**膀胱氣急**宜下氣用蕪荑搗和食鹽末等分以綿裹如棗大納下部或下

惡汁並下氣佳**嬰孩驚瘧**風後失瘧不能言肥兒丸外臺秘要用蕪荑炒神麴炒麥蘗炒

黃連炒各一錢爲末猪膽汁打糊丸黍米大每服蟲十九木通湯下黃連能去心竅惡血全幼心鑑蟲

牙作痛以蕪荑仁安蛀孔中及縫**腹中鼈瘕**平時嗜中甚效危氏得效方酒血入

于酒則爲酒鼈平時多氣血凝于氣則爲氣鼈虛勞瘕冷敗血雜痰則爲血鼈搖頭掉尾如虫之行上侵

人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹大則如鼈小或如錢治法惟用蕪荑炒煎服之兼用暖胃益血理中

之類乃可殺之若徒事雷九錫灰之類無益也見仁齋直指方

蘇方木唐本草

釋名蘇木

時珍曰海島有蘇方木其地產此木故名令人省呼爲蘇木耳

集解

蘇曰蘇方木自南海崑崙來而交州愛州亦有之樹似菴羅葉若榆葉而無澀抽條長丈許花

黃子青熟黑其木人用染絳色珣曰按徐表南方草云生海畔葉似絳木若女貞時珍曰按嵇含南方草木狀云蘓方樹類槐黃花黑子出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之糞名曰紫納亦可用暹羅國人賤薪用如

修治

穀曰凡使去上粗皮并節若得中心文橫如紫角者號曰木中尊其力倍常百等須細剉重搗

泮細梅樹枝蒸之從已至申陰乾用

氣味甘鹹平無毒

杲曰甘鹹涼可升可降陽中陰

也好古曰味甘而微酸辛其性平

主治破血產後血脹悶欲死者水

煮五兩取濃汁服

唐本

婦人血氣心腹痛月候不調及

蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤

白痢并後分急痛

大明

虛勞血癖氣壅滯產後惡露不

安心腹攪痛及經絡不通男女中風口噤不語並宜

細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木調服立吐惡

物瘥

海藥

霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服

藏器

破瘡瘍

死血產後敗血

李杲

發明

元素曰蕪木性涼味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血腫脹滿欲死者

宜之時珍曰蘓方木乃三陰經血
分藥少用則和血多用則破血

附方

舊一
新五

產後血運

蘓方木三兩水五升煎取二升分服

產後氣喘

黑面

欲死乃血入肺也用蘓木二兩水兩碗煮一碗入人參末一兩服隨時加減神效不可言耳 胡氏方

破傷風病

蘓方木爲散三錢酒服立效名獨聖散

普濟方

脚氣腫痛

蘓方木鷺

鷺藤等分細剉入定粉少許水二斗煎一斗五升先熏後洗 普濟方

偏墜腫痛

蘓方木二

兩好酒一壺煮熟頻飲立好 集簡方

金瘡接指

凡指斷及刀斧傷用真蘓木末傅之外以

蠶繭包縛完固數日如故 攝生方

烏木

綱目

釋名烏檣木

楠音漫

烏文木

時珍曰本名文木南人呼文如楠故也

集解

時珍曰烏木生海南雲南南番葉似椶櫚其木漆黑體重堅緻可爲筋及器物有間道者嫩木

也南人多以槩木染色僞之南方草物狀云文木樹高七八尺其色正黑如水牛角作馬鞭日南有之古今注云烏文木出波斯船上將來烏文闊然溫枯婆等州亦出之皆此物也

氣味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑研

末溫酒服

時珍

樺木

宋開寶

釋名櫨

藏器曰晉中書令王珣傷寒身驗方中作櫨字時珍曰畫工以皮燒烟熏紙作古畫字故

名槿俗省
作樺字也

集解

藏器曰樺木似山桃皮堪爲燭宗真曰皮上有紫黑花勻者裹鞍弓韉時珍曰樺木生遼東及

臨洮河州西北諸地其木色黃有小斑點紅色能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用襯鞞裏及爲刀靶之類謂之暖皮胡人尤重之以皮卷蠟可作燭點

木皮氣味苦平無毒主治諸黃疸濃煮汁飲之良

開寶

煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良即今豌豆瘡也

藏器燒灰合他藥治肺風毒

宗真治乳癰

時珍

附方

舊一
新四

乳癰初發

腫痛結硬欲破一服即瘥以北來真樺皮燒存性研無灰酒溫

服方寸匕即卧覺即瘥也 沈存中靈苑方 乳癰腐爛 靴內年久樺皮燒

服 唐 肺風毒瘡 遍身瘡疥如癰及癰疹瘙痒面上

瑤經 樺皮燒灰四兩枳殼去穰燒四兩荆芥穗二兩炙甘草半兩各爲末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛研

勻每服二錢食後溫酒調下 瘡疥甚者日三服 和劑方 小便熱短 樺皮濃煮汁

染黑鬚髮 樺皮一片包側栢一枝燒烟熏香油盪內 成烟以手抹在鬚髮上即黑也 多能鄙

事

脂主治燒之辟鬼邪 藏器

綬木 拾遺

釋名集解

藏器曰生林澤山谷木文側戾故曰緹木

氣味甘溫無毒主治風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸

酒飲

藏器

櫚木

拾遺

集解

藏器曰出安南及南海用作床几似紫檀而色赤性堅好時珍曰木性堅紫紅色亦有花紋者

謂之花櫚木可作器皿扇骨諸物俗作花梨誤矣

氣味辛溫無毒主治產後惡露衝心癥瘕結氣赤白

漏下竝剉煎服

李珣

破血塊冷嗽煮汁熱服爲枕令人

頭痛性熱故也

藏器

梭櫚

宋嘉祐

釋名

時珍曰皮中毛縷如馬之駿鬣故名梭俗作棕

集解

頌曰梭櫚出嶺南西川今江南亦有之木高二丈無枝條葉大而圓有如車輪萃于樹杪其

下有皮重疊裹之每皮一匝爲一節二旬一采皮轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月采其皮用山海經云石翠之山其木多梭是也藏器曰其皮作繩入水千歲不爛昔有人開塚得一索已生根嶺南有桄榔椰子冬葉虎散多羅等木葉皆與梭櫚相類時珍曰梭櫚廣川甚多今江南亦種之最難長初生葉如白及葉高二三尺則木端數葉大如扇上聳四散歧裂其莖三稜四

時不凋其幹正直無枝近葉處有皮裹之每長一層即爲一節幹身赤黑皆筋絡宜爲鐘杵亦可旋爲器物其皮有絲毛錯縱如織剝取縷解可織衣帽褥椅之屬大爲時利每歲必兩三剝之否則樹死或不長也三月于木端莖中出數黃苞苞中有細子成列乃花之孕也狀如魚腹孕子謂之梭魚亦曰梭筭漸長出苞則成花穗黃白色結實累累大如豆生黃熟黑甚堅實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚鄭樵通志以爲王篲者非也王篲乃落帚之名即地膚子別有蒲葵葉與此相似而柔薄可爲扇笠許慎說文以爲梭欄亦誤矣

筍及子花氣味苦澁平無毒

藏器曰有小毒戟人喉未可輕服珣曰溫有大

毒不堪食時珍曰梭筍皆言有毒不可食而廣蜀人蜜煮醋浸以供佛寄遠蘇東坡亦有食梭筍詩乃制

去其毒爾
主治澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血藏器

附方新
大腸下血

樓筍煮熟切片晒乾爲末蜜湯或酒服一二錢 集簡方

皮氣味同

子

主治止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢崩

中帶下燒存性用

大

主金瘡疥癬生肌止血

李珣

發明

宗真曰樓皮燒黑治婦人血露及吐血須佐以他藥時珍曰樓灰性澀若失血去多淤滯已盡

者用之切當所謂澀可去脫也與亂髮同用更良年久敗樓入藥尤妙

附方新

六

鼻血不止

樓

櫚灰隨左右吹之 黎居士方

血崩不止

樓櫚皮燒

存性空心淡酒服

三錢

一方

血淋不止

樓櫚皮半燒半炒爲末每

服二錢甚效
衛生家寶方

下血不止

櫻櫚皮半斤括樓一箇燒灰每服二錢米飲調下

百一
選方 **水穀痢下**

櫻櫚皮燒研水服方寸匕

近效方

小便不通

櫻櫚皮毛燒存性

以水酒服二錢即通利
累試甚驗 攝生方

檮木

檮良必切
拾遺

釋名檀木

音潭

集解

藏器曰檮木生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥白餘灰入染家用時珍曰此

木最硬梓人謂之檮筋木是也木入染絳用葉亦可醱酒

木灰氣味甘溫小毒主治卒心腹癥瘕堅滿瘰癧淋

汁八升釀米一斗待酒熟每溫飲半合漸增至一二

盞即愈

藏器
出肘後

柯樹

格
遺

釋名集解木奴

珣曰按廣志云生廣南山谷波斯家用木爲船舫者也

白皮氣味辛平有小毒主治大腹水病采皮煮汁

去滓煎令可丸如梧子大平旦空心飲下三丸須臾

又一丸氣水竝從小便出也

藏器

烏白木

唐本草

釋名鵝白

時珍曰烏白鳥喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歌每依鵝白影桃頻時見鼠姑

心是矣鼠姑牡丹也或云其木老則根下黑爛成曰故得此名鄭樵通志言烏白即拒柳者非

集解

恭曰生山南平澤樹高數仞葉似梨杏五月開細花黃白色子黑色藏器曰葉可染皂子可壓

油然燈極明宗真曰葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分爲三瓣時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子蒸煮取脂澆燭貨之于上皮膚勝于仁也

根白皮氣味苦微溫有毒

大明曰性涼慢火炙乾黃乃用

主治暴水

癥結積聚

唐本

療頭風通大小便

大明

解蛇毒

震亨

發明

時珍曰烏白根性沉而降陰中之陰利水通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令掘此根搗爛

水煎服一盃連行數行而病平氣虛人不可用之此方出太平聖惠方言其功神聖但不可多服爾誠然

附方

舊一
新九

小便不通

烏白根皮煎湯飲之肘后方

大便不通

烏白根

方長一寸劈破水煎半盞服之立通不用多喫其功神聖兼能取水斗門方**二便關格**三

日則殺人烏白東南根白皮乾爲末熱水服二錢先以芒硝二兩煎湯服取吐甚效肘后方**水氣**

虛腫

小便澀烏白皮檳榔木通一兩爲末每服二錢米飲下聖惠方

脚氣濕瘡

極

有蟲烏白根爲末傅之尸注中惡心腹痛刺沉默少時有涎出良摘玄方

皮煎濃汁一合調硃砂末一錢暗疔昏狂瘡頭凸服之肘后方無硃砂永類方紅柏樹

根經行路者取二尺許去皮搗爛并華水調一盞服待瀉過以三角銀杏仁浸油搗合患處聖濟總錄

嬰兒胎瘡

滿頭用水邊烏臼樹根晒研入雄黃末少許生油調搽經驗良方

鼠莽砒

毒

鳥白根半兩搗水服之醫方大成

鹽麝痰喘

柏樹皮去粗搗汁和飛麝作餅烙熟早晨

與兒喫三四箇待吐下鹽涎乃佳如不行熱茶催之

摘玄方

葉氣味

同根

主治食牛馬六畜肉生疔腫欲死者搗自

然汁一二盞頓服得大利去毒即愈未利再服冬用

根

時珍

柏油氣味甘涼無毒主治塗頭變白為黑服一合令

人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

塗一切腫毒

瘡疥

時珍

附方

新

二膿泡疥瘡

柏油

二兩

水銀

二錢

樟腦

五錢

同

研頻入唾津

不見星

乃止

以溫湯

洗

淨瘡

以藥填入

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗

之與兒穿着次日蟲皆

出油上取下燼之有聲是也別以油衣

與穿以蟲盡爲度效

瀕海集簡方

巴豆

本經下品

釋名巴菽

本經

剛子

炮

老陽子

時珍

曰此物出巴蜀而

形如菽豆故以名之宋

本草一名巴椒乃菽字傳訛也雷斅炮炙論又分緊

小色黃者爲巴有三稜色黑者爲豆小而兩頭尖者

爲剛子云巴與豆可用剛子不可用殺入其說殊乖

蓋緊小者是雌有稜及兩頭尖者是雄雄者峻利雌

與剛子云巴與豆可用剛子不可用殺入其說殊乖

者稍緩也用之得宜皆有力用之失宜參朮亦能爲害况巴豆乎

集解

別錄曰巴豆生巴郡川谷八月采陰乾用之去皮頌曰今嘉州眉州戎州皆有之木高一二

丈葉如櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤至十二月葉漸稠二月復漸生四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落乃收之一房有二瓣一瓣一子或三子子仍有殼用之去殼戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等他處亦稀有時珍曰巴豆房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松子所云似白豆蔻者殊不類

修治

弘景曰巴豆最能瀉人新者佳用之去皮心熱令黃黑搗如膏乃和丸散散曰凡用巴與豆敲

碎以麻油并酒等煮乾研膏用每一兩用油酒各七合大明曰凡入丸散炒用不如去心膜換水煮五度各一沸也時珍曰巴豆有用仁者用殼者用油者有生用者麩炒者醋煮者燒存性者有研爛以紙包壓去油者謂之巴豆霜

氣味辛溫有毒

別錄曰生溫熟寒有大毒普曰神農岐伯桐君辛有毒黃帝甘有毒李當

之熱元素曰性熱味苦氣薄味厚體重而沉降陰也果曰性熱味辛有大毒浮也陽中陽也時珍曰巴豆氣熱味辛生猛熟緩能吐能下能止能行是可升可降藥也別錄言其熟則性寒張氏言其降李氏言其浮皆泥于一偏矣蓋此物不去膜則傷胃不去心則作嘔以沉香水浸則能升能降與大黃同用瀉人反緩爲其性相畏也王充論衡云萬物合太陽火氣而生者皆有毒故巴豆辛熱有毒之才曰芫花爲之使

畏大黃黃連蘆笋菰笋蒸蘆醬豉冷水得火良惡藁
草與牽牛相反中其毒者用冷水黃連汁大豆汁解

之

主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖

大腹蕩練五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除

鬼毒蟲疰邪物殺蟲魚

本經

療女子月閉爛胎金瘡膿

血不利丈夫殺斑蝥蛇虺毒可練餌之益血脉令人

色好變化與鬼神通

別錄

治十種水腫痿痺落胎

藥性

通

宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排

膿消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫

日華

導

氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷元素治瀉痢驚

痢心腹痛疝氣風蝎耳聾喉痺牙痛通利開竅時珍

發明

元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去胃中寒積無寒積者勿用元素曰世

也以巴豆熱藥治酒病膈氣以其辛熱能開腸胃鬱結也但鬱結雖開而亡血液損其真陰從正曰傷寒風溼小兒瘡痘婦人產後用之下膈不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏巴豆以其性熱而劑小耳豈知以蠟匱之猶能下後使人津液枯竭胃熱口燥耗却天真留毒不去他病轉生故下藥官以爲禁藏器曰巴豆主癰癰瘰癧瘡滿積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少頃腹內熱如火利止惡物雖利而不虛若久服亦

不利人白膜破者不用好古曰若急治爲水穀道路
之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒
去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張
仲景治百病客忤備急丸用之時珍曰巴豆峻用則
有戡亂却病之功微用亦有撫緩調中之妙譬之蕭
曹絳灌乃勇猛武夫而用之爲相亦能輔治太平王
海藏言其可以通腸可以用之爲相亦能輔治太平王
老婦年六十飲病溏泄已五年肉食油物生冷犯之
即作痛服調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚延余
診之脉沉而滑此乃脾胃久傷冷積凝滯所致王太
僕所謂大寒凝內久利溏泄愈而復發綿歷歲年者
法當以熱下之則寒去利止遂用蠟墮巴豆丸藥五
十九與服二日大便秘不通亦不利其泄遂愈自是每
用治泄痢積滯諸病皆不瀉而病瘳者近百人妙在
配合得宜藥病相對耳苟用所
不當用則犯輕用損陰之戒矣

正誤

弘景曰道家亦有煉餌法服之云可神仙人吞一枚便死而鼠食之三年重三十斤物性乃有

相耐如此時珍曰漢時方士言巴豆鍊餌令人色好神仙名醫別錄采入本草張華博物志言鼠食巴豆重三十斤一謬一誣陶氏信爲實語誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之

附方

舊十三新二十六

一切積滯

巴豆一兩蛤粉二兩黃蘗三兩爲末水丸綠豆大每

水下五丸

寒澼宿食

不消大便閉塞巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研熟

合酒微火煎令可丸如一丸水下一丸欲吐者二丸

豌豆大每服十金方

水蟲大腹

動搖水聲

皮膚色黑巴豆九十枚去心皮熬黃杏仁六十枚去皮尖熬黃擣九小豆大水下丸以利爲度勿飲酒

備急方

張文仲

飛尸鬼擊

中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆二枚去皮心熬黃杏

仁二枚以綿包推碎熱湯一合捻取白食瘡積瘡

汁服之當下而瘡量老小用之外臺

去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸積滯泄痢

綠豆大一服一九冷湯下肘后方積滯泄痢

杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇同燒存性研

沉溶蠟和丸綠豆大每服二三九煎大黃湯下間日

錢一服劉守真宣明方氣痢赤白巴豆一兩去皮心熟

大空心米飲下三四九量人用此瀉血不止

乃鄭獬侍御所傳方也經驗方

以雞子開一孔納入紙封煨熟去豆食之小兒下痢

其病即止虛人分作二服決效普濟方

赤白用巴豆煨熟去油一錢百草霜二錢研末飛羅

麵煮糊丸黍米大量人用之赤用甘草湯白用米湯

赤白用薑湯下夏月水瀉性不止巴豆一粒針頭燒存

全幼心鑑

下危氏小兒吐瀉巴豆一箇針穿燈上燒過黃蠟

得效方九黍米大每用五七丸伏暑霍亂傷冷吐利煩濕水

蓮子燈心湯下同上一五箇去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和

丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水吞下

和劑乾霍亂病去心腹脹痛不吐不利欲死巴豆一枚

二便不通巴豆連油連黃各半兩搗作餅子先滴葱

度楊氏家藏寒痰氣喘青橘皮一片展開入剛子一箇麻

一鍾呷服天台李翰林用此治莫風濕痰病室中左

秀才到口便止神方也張果醫說風濕痰病用滾水一盆右用炭火一盆前置一桌書一冊先將

無油新巴豆四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅

如病在左令病人將右手仰置書上安藥于掌心以
盥安藥上傾熱水入盥內水涼即換良久汗出立見
神效病在右安左掌心一云隨
左右安之保壽堂經驗方陰毒傷寒心結按之
極痛大小

便閉但出氣稍暖者急取巴豆十粒研入麴一錢捻
作餅安臍內以小艾炷灸五壯氣達即通此太師陳

北山方也仁齋直指方解中毒藥巴豆去皮不去油馬牙硝等
分研丸冷水服一彈丸廣

利喉痺垂死止有餘氣者巴豆去皮線穿
方喉痺垂死內入喉中牽出即甦千金纏喉風痺

巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭以針傷寒舌出一粒
穿孔內入喉中氣透即通勝金方

去油取霜以紙蘸卷內入舌上出血如箸孔巴豆一
鼻中舌即收上普濟方舌上出血枚亂髮鷄子大

燒研酒服聖惠中風口喝巴豆七枚去皮研左喝塗右手
心右喝塗左手心仍以暖水一

蓋安藥上須臾即小兒口瘡不能食乳剛子一枚連正洗去聖惠方油研入黃丹少許刺去

顛上髮貼之四邊起粟泡便用溫水洗去乃風蟲牙以菖蒲湯再洗即不成瘡神效瑞竹堂方

痛聖惠用巴豆一粒煨黃去殼蒜一瓣切一頭刺去中心入豆在內蓋定綿裹隨左右塞耳中經驗

方用巴豆一粒研綿裹咬之又方針刺天絲入咽巴豆燈上燒令烟出熏痛處三五次神效

凡露地飲食有飛絲入上食之令人咽喉生瘡急以白礬巴豆燒灰吹入即愈瑣碎錄耳卒聾

閉巴豆一粒紙裹針刺孔風瘙隱疹心下迷悶巴豆通氣塞之取效經驗五十粒去皮水

七升煮二升以帛染拭疥瘡搔痒巴豆十粒炮黃去之隨手瘡千金翼皮心右順手研入

酥少許膩粉少許搽破點上不得近目并外腎荷錢上如熏目著腎則以黃丹塗之甚妙千金方

癬瘡

巴豆仁三箇連油杵泥以生絹包擦日一切惡

瘡

巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效普濟癰疽惡肉烏金

一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新巴豆仁炒焦研膏點痛處則解毒塗瘀肉上則自化加乳香少許

亦可若毒深不能收斂者宜作瘡痣黑子巴豆一錢

人言一錢糯米五分炒研點之怪症方箭鏃入肉不可拔出者用新巴

豆仁畧熬與蠅蜋同研塗之斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便搗拔

動之取出速以生肌膏傅之而瘡亦治瘡腫夏侯鄆

在潤州得此方後至洪州旅舍主人妻病背瘡小兒

痰喘

巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男左女右痰即自下龔氏醫鑑

牛疫動頭

巴豆二粒

生麻油三兩漿水半升
和灌之 賈相公牛經

油主治中風痰厥氣厥中惡喉痺一切急病咽喉
不通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取油作熬點
燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入喉內即時出涎或惡
血便甦又舌上無故出血以熏舌之上下自止

時珍

穀主治消積滯治瀉痢

時珍

附方 新一切瀉痢

脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止名勝金膏巴豆皮楮葉同

燒存性研化蠟丸綠豆大每甘痢頻脫肛黑色堅硬

草湯下五丸

劉河間宣明方

用巴豆殼

燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用真麻油點
火滴于上以枯礬龍骨少許爲末摻肛頭上以芭蕉
葉托入危
氏得效方

樹根主治癰疽發背腦疽鬚疽大患掘取洗搗敷患

處留頭妙不可言收根陰乾臨時水搗亦可

時珍
出楊誠

經驗
方

大風子

補遺

釋名

時珍曰能治
大風疾故名

集解

時珍曰大風子今海南諸蕃國皆有之按周達
觀真臘記云大風乃大樹之子狀如椰子而圓

其中有核數十枚大如雷凡子中有仁白色久則黃而油不堪入藥

仁修治

時珍曰取大風子油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口入滾湯中蓋鍋

密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以和藥

氣味辛熱有毒主治風癰疥癩楊梅諸瘡攻毒殺蟲

時珍

發明

震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先

失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲劫毒之功蓋不可多用之外塗其功不可沒也

附方

新

大風諸癰

大風子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸梧子大每服五十丸空心

溫酒下仍以苦參湯洗之

普濟方

大風瘡裂

大風子燒存性和麻油輕粉研塗仍以穀煎湯

洗之

嶺

楊梅惡瘡

方同上

風刺赤鼻

大風子仁木鼈子仁輕粉硫黃

南衛生方

爲末夜夜唾調塗之

手背皴裂

大風子搗泥塗之壽域

海紅豆

海藥

釋名集解

珣曰按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種之亦

成時珍曰樹高二三丈葉似梨葉而圓按宋祁益部方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢枝間其子累累而綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果飣

豆氣味微寒有小毒主治人黑皮黧黯花癬頭面遊

風宜入面藥及漂豆

李珣

相思子

綱目

釋名紅豆

時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人歿于邊其妻思之哭于樹下

而卒因以名之此與韓憑塚上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否

集解

時珍曰相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆半

截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子収龍腦香相宜令香不耗也

氣味苦平有小毒吐人主治通九竅去心腹邪氣止

熱悶頭痛風痰瘴癘殺腹臟及皮膚內一切蟲除

蠱毒取二七枚研服即當吐出

時珍

附方

新

瘴瘧寒熱

相思子十四枚水研取吐立瘥

千金

貓鬼野道

見

貓鬼及耳有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如麻子大服之即以灰圍患

人面前着一斗灰火吐藥入火中沸即畫十字于火上其貓鬼者死也

千金方 解中蠱毒

必效方用未鑽相思子十四枚杵碎爲末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七

枚神效

外臺秘要

猪腰子

綱目

集解

時珍曰猪腰子生柳州蔓生結莢內子大若猪之內腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅彼人

以充土宜
饋送中土

氣味甘微辛無毒主治一切瘡毒及毒箭傷研細

酒服一二錢并塗之

時珍

石瓜

綱目

集解

時珍曰石瓜出四川峨眉山中及芒部地方其樹脩幹樹端挺葉肥滑如冬青狀似桑其花淺

黃色結實如綴長而不圓壳裂則子見其形似瓜其堅如石者液黃色

氣味苦平無毒主治心痛煎汁洗風痺

時珍

本草綱目卷三十五下